

## EXERCICE 1

1) Supposons que la suite  $(X_n)$  converge en moyenne vers  $X$ . Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .

La variable aléatoire  $|X_n - X|$  est à valeurs positives et possède une espérance. L'inégalité de Markov donne alors :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, 0 \leq P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \frac{E(|X_n - X|)}{\varepsilon}.$$

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(|X_n - X|) = 0$ , par encadrement on obtient :  $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$ .

Alors la suite  $(X_n)$  converge en probabilité vers  $X$ .

Si la suite  $(X_n)$  converge en moyenne vers  $X$ , alors elle converge en probabilité vers  $X$ .

2) a) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .  $Y_n$  prend une valeur non nulle si et seulement si les variables aléatoires  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  prennent une valeur non nulle.

$$\text{Alors } \{Y_n \neq 0\} = \bigcap_{k=1}^n \{Z_k \neq 0\} \text{ donc } P(Y_n \neq 0) = P\left(\bigcap_{k=1}^n \{Z_k \neq 0\}\right).$$

$$\text{Par indépendance il vient : } P(Y_n \neq 0) = \prod_{k=1}^n P(Z_k \neq 0) = \prod_{k=1}^n (1 - P(Z_k = 0)).$$

$$\text{Or } Z_1, Z_2, \dots, Z_n \text{ suivent la loi de Poisson de paramètre } \lambda \text{ donc : } P(Y_n \neq 0) = \prod_{k=1}^n (1 - e^{-\lambda}) = (1 - e^{-\lambda})^n.$$

$$\text{Pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } P(Y_n \neq 0) = (1 - e^{-\lambda})^n.$$

b) Si  $n$  est un élément de  $\mathbb{N}^*$  et si  $\varepsilon$  est un réel strictement positif, la réalisation de l'événement  $\{Y_n > \varepsilon\}$  entraîne la réalisation de l'événement  $\{Y_n \neq 0\}$  !

$$\text{Pour tout réel strictement positif } \varepsilon \text{ et pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } \{Y_n > \varepsilon\} \subset \{Y_n \neq 0\}.$$

c) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$  et soit  $\varepsilon$  un réel strictement positif.

$$\{Y_n > \varepsilon\} \subset \{Y_n \neq 0\} \text{ donc par croissance de } P : P(Y_n > \varepsilon) \leq P(Y_n \neq 0).$$

De plus  $Y_n$  prend des valeurs positives ou nulles car  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  prennent des valeurs positives ou nulles.

$$\text{Ainsi : } 0 \leq P(|Y_n - 0| > \varepsilon) = P(|Y_n| > \varepsilon) = P(Y_n > \varepsilon) \leq P(Y_n \neq 0) = (1 - e^{-\lambda})^n.$$

$$\lambda \text{ est (strictement) positif donc } |1 - e^{-\lambda}| = 1 - e^{-\lambda} < 1. \text{ Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - e^{-\lambda})^n = 0.$$

Par encadrement on obtient alors :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - 0| > \varepsilon) = 0$  et ceci pour tout réel  $\varepsilon$  strictement positif.

La suite  $(Y_n)$  converge en probabilité vers la variable certaine égale à 0.

3) Ici une petite modification du texte s'impose ! Dans l'ensemble de la question nous supposons que la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers une variable aléatoire  $Y$  afin que le  $Y$  de c) ne se sente pas trop seul...

a) Nous avons supposé que la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers une variable aléatoire  $Y$ . Alors, d'après la première question, la suite  $(Y_n)$  converge en probabilité vers  $Y$ . Or d'après la seconde question la suite  $(Y_n)$  converge en probabilité vers la variable aléatoire certaine égale à 0.

Le résultat admis au début de l'exercice permet de dire que  $P(Y = 0) = 1$ .

Si la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers une variable aléatoire  $Y$  alors  $P(Y = 0) = 1$ .

b) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  possèdent une espérance qui vaut  $\lambda$  et ces variables sont indépendantes.

Alors  $Z_1 \times Z_2 \times \dots \times Z_n$  possède une espérance qui vaut  $E(Z_1) \times E(Z_2) \times \dots \times E(Z_n)$  donc  $\lambda^n$ .

Donc  $E(Y_n)$  existe et vaut  $\lambda^n$ .

Pour tout élément non nul de  $\mathbb{N}^*$ ,  $E(Y_n)$  existe et vaut  $\lambda^n$ .

c)  $Y$  est presque sûrement égale à 0 donc  $Y$  possède une espérance qui vaut 0.

Rappelons que  $Y_n$  possède une espérance qui vaut  $\lambda^n$ .

Comme la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers  $Y$ ,  $E(|Y_n - Y|)$  existe pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}^*$ .

Remarquons que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, |Y_n - Y| \geq Y_n - Y$ .

La croissance et la linéarité de l'espérance donnent alors :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, E(|Y_n - Y|) \geq E(Y_n - Y) = E(Y_n) - E(Y)$ .

$\forall n \in \mathbb{N}^*, E(|Y_n - Y|) \geq E(Y_n) - E(Y)$ .

$\forall n \in \mathbb{N}^*, E(|Y_n - Y|) \geq E(Y_n) - E(Y) = \lambda^n - 0 = \lambda^n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda^n = +\infty$  car  $\lambda > 1$ . Ainsi :

Si la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers une variable aléatoire  $Y$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(|Y_n - Y|) = +\infty !!$

$\nabla$  Remarque En fait la minoration  $E(|Y_n - Y|) \geq E(Y_n) - E(Y)$  ne sert à rien car on a presque sûrement (!) directement  $E(|Y_n - Y|) = E(Y_n) = \lambda^n$ .  $\nabla$

4) Si la suite  $(Y_n)$  converge en moyenne vers une variable aléatoire  $Y$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(|Y_n - Y|) = +\infty$ . Ceci est légèrement contradictoire. Donc la suite  $(Y_n)$  ne converge pas en moyenne vers  $Y$ .

La suite  $(Y_n)$  ne converge pas en moyenne.

Donc la suite  $(Y_n)$  converge en probabilité sans converger en moyenne.

La convergence en moyenne entraîne la convergence en probabilité mais la réciproque est fautive.

## EXERCICE 2

1) a) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .

$t \rightarrow \frac{1}{(1+t^\alpha)^n}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$  est alors de même nature que  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$ .

•  $\frac{1}{1+t^\alpha} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^\alpha}$  donc  $\frac{1}{(1+t^\alpha)^n} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha n}}$ .

- $t \rightarrow \frac{1}{t^{\alpha n}}$  est positive sur  $[1, +\infty[$ .
- $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha n}}$  converge car  $\alpha n > 1$  puisque  $n \geq 1$  et  $\alpha > 1$ .

Les règles de comparaison sur les intégrales généralisées de fonctions positives montrent alors que  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$  converge. Ainsi  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$  converge et  $u_n$  est défini.

$$\forall t \in [0, +\infty[, \frac{1}{(1+t^\alpha)^n} > 0 \text{ donc } u_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} > 0.$$

Pour tout élément  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ,  $u_n$  est bien défini et  $u_n > 0$ .

**b)** Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .

$\forall t \in [0, +\infty[, 1+t^\alpha \geq 1$  et  $n+1 \geq n$ . Donc  $\forall t \in [0, +\infty[, (1+t^\alpha)^{n+1} \geq (1+t^\alpha)^n > 0$ .

Ainsi  $\forall t \in [0, +\infty[, \frac{1}{(1+t^\alpha)^{n+1}} \leq \frac{1}{(1+t^\alpha)^n}$ . Ceci donne en intégrant :  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^{n+1}} \leq \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$ .

Alors  $u_{n+1} \leq u_n$  et ceci pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}^*$ .

La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante.

La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  est décroissante et minorée par 0 donc elle est convergente.

La suite  $(u_n)_{n \geq 1}$  converge.

**2) a)** Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ . Soit  $A$  un réel strictement positif.

Posons :  $\forall t \in [0, +\infty[, f(t) = t$  et  $g(t) = \frac{1}{(1+t^\alpha)^n}$ .

$f$  et  $g$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, +\infty[$ . De plus  $\forall t \in [0, +\infty[, f'(t) = 1$  et  $g'(t) = -n\alpha \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t^\alpha)^{n+1}}$ . En intégrant par parties il vient :

$$\begin{aligned} \int_0^A \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} &= \int_0^A 1 \times \frac{1}{(1+t^\alpha)^n} dt = \left[ t \times \frac{1}{(1+t^\alpha)^n} \right]_0^A - \int_0^A t \left( -n\alpha \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t^\alpha)^{n+1}} \right) dt. \\ \int_0^A \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} &= \frac{A}{(1+A^\alpha)^n} + n\alpha \int_0^A \frac{t^\alpha}{(1+t^\alpha)^{n+1}} dt = \frac{A}{(1+A^\alpha)^n} + n\alpha \int_0^A \frac{(1+t^\alpha) - 1}{(1+t^\alpha)^{n+1}} dt. \\ \int_0^A \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} &= \frac{A}{(1+A^\alpha)^n} + n\alpha \int_0^A \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} - n\alpha \int_0^A \frac{dt}{(1+t^\alpha)^{n+1}} \quad (1). \end{aligned}$$

Notons que :  $\frac{A}{(1+A^\alpha)^n} \underset{A \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{A}{A^{\alpha n}} = \frac{1}{A^{\alpha n - 1}}$ .

Comme  $\alpha n - 1$  est strictement supérieur à 0 ( $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\alpha > 1$ ),  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^{\alpha n - 1}} = 0$  donc  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A}{(1+A^\alpha)^n} = 0$ .

Comme  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n}$  et  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^{n+1}}$  convergent, en faisant tendre  $A$  vers  $+\infty$  dans (1) on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} = n\alpha \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^n} - n\alpha \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^\alpha)^{n+1}}. \text{ Ainsi } u_n = n\alpha u_n - n\alpha u_{n+1} = n\alpha (u_n - u_{n+1}).$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = n\alpha (u_n - u_{n+1})$ .

b) Soit  $n$  un élément de  $\llbracket 2, +\infty \llbracket$ .

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, u_k = k\alpha(u_k - u_{k+1}) \text{ donc } \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, u_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) u_k.$$

On a encore  $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \frac{u_{k+1}}{u_k} = \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)$  car  $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, u_k > 0$ .

$$\text{Alors } \prod_{k=1}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \text{ ce qui donne } \frac{u_n}{u_1} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \text{ ou encore } u_n = u_1 \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right).$$

$$\text{Pour tout entier } n \text{ supérieur ou égal à } 2, \text{ on a } u_n = u_1 \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right).$$

3) Rappelons que la suite des sommes partielles d'une série à termes positifs divergente tend vers  $+\infty$ .

$$\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \ln u_n = \ln u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \text{ car } u_1 > 0 \text{ et } \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, 1 - \frac{1}{k\alpha} > 0.$$

- $-\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{k\alpha}$ .
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, -\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \geq 0$ .
- La série de terme général  $\frac{1}{k\alpha}$  est divergente.

Les règles de comparaison sur les séries à termes positifs montrent que la série de terme général  $-\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)$  est divergente. Cette série étant à termes positifs la suite de ses sommes partielles tend vers  $+\infty$ .

$$\text{Ainsi } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(-\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)\right) = +\infty \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) = -\infty.$$

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\ln u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)\right) = -\infty. \text{ Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\ln u_n} = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

4) a) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (k\alpha(u_k - u_{k+1})) = \sum_{k=1}^n (k\alpha u_k) - \sum_{k=1}^n (k\alpha u_{k+1}).$$

Un petit changement d'indice sur la seconde somme donne :

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (k\alpha u_k) - \sum_{k=2}^{n+1} ((k-1)\alpha u_k) = \sum_{k=1}^n (k\alpha u_k) - \sum_{k=1}^{n+1} ((k-1)\alpha u_k).$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (k\alpha u_k - ((k-1)\alpha u_k)) - n\alpha u_{n+1} = \alpha \sum_{k=1}^n u_k - n\alpha u_{n+1} = \alpha S_n - n\alpha u_{n+1}.$$

$$\text{Alors } (\alpha - 1) S_n = n\alpha u_{n+1}. \text{ Comme } \alpha \text{ est différent de } 1 : S_n = \frac{n\alpha}{\alpha - 1} u_{n+1}.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \frac{n\alpha}{\alpha - 1} u_{n+1}.$$

b) Soit  $n$  dans  $\llbracket 2, +\infty \llbracket$ .  $S_n = \frac{n\alpha}{\alpha-1} u_{n+1} = \frac{n\alpha}{\alpha-1} u_1 \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) = \frac{n\alpha}{\alpha-1} u_1 \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right)$ .

$$S_n = \frac{n\alpha}{\alpha-1} u_1 \frac{\alpha-1}{\alpha} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) = n u_1 \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right).$$

$$\text{Alors } \ln(S_n) = \ln n + \ln u_1 + \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) = \ln u_1 + \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) + \ln n.$$

$$\text{Observons alors que } n = \prod_{k=2}^n \frac{k}{k-1}. \text{ Ainsi } \ln n = \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k}{k-1}\right) = -\sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k-1}{k}\right) = -\sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right).$$

$$\text{Ainsi } \ln(S_n) = \ln(u_1) + \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \ln(u_1) + \sum_{k=2}^n \left[ \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \right].$$

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \ln(S_n) = \ln(u_1) + \sum_{k=2}^n \left[ \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \right].}$$

$$\text{c) } \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) = -\frac{1}{k\alpha} + \underset{k \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{k}\right) \text{ et } \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) = -\frac{1}{k} + \underset{k \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{k}\right).$$

Donc  $\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) = -\frac{1}{k\alpha} + \frac{1}{k} + \underset{k \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{k}\right) = \frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{1}{k} + \underset{k \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{1}{k}\right)$ . Comme  $\frac{\alpha-1}{\alpha}$  n'est pas nul :

$$\boxed{\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{1}{k}.}$$

$$\text{d) } \bullet \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{1}{k}.$$

$$\bullet \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{1}{k} \geq 0.$$

• la série de terme général  $\frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{1}{k}$  est divergente.

Les règles de comparaison sur les séries à termes positifs montrent alors que la série de terme général  $\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right)$  diverge.

$$\alpha > 1 \text{ donc } \forall k \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \frac{1}{k\alpha} \leq \frac{1}{k}. \text{ Alors } \forall k \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, 1 - \frac{1}{k\alpha} \geq 1 - \frac{1}{k} > 0.$$

$$\text{Ainsi } \forall k \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) \geq \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right). \text{ Finalement } \forall k \in \llbracket 2, +\infty \llbracket, \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \geq 0.$$

La série de terme général  $\ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right)$  diverge et est à termes positifs donc la suite de ses sommes partielles tend vers  $+\infty$ .

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(S_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \ln(u_1) + \sum_{k=2}^n \left[ \ln \left(1 - \frac{1}{k\alpha}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) \right] \right) = +\infty.$$

Ceci donne encore  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\ln S_n} = +\infty$ . Plus de doute :

$$\boxed{\text{la série de terme général } u_n \text{ diverge.}}$$

$$\text{5) Ici } \alpha = 2. u_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{dt}{1+t^2} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[ \arctan t \right]_0^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \arctan A = \frac{\pi}{2}.$$

De plus  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{2n}\right) u_n$  ou  $\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket$ ,  $u_n = \left(1 - \frac{1}{2(n-1)}\right) u_{n-1}$ .

```

1 Function u(n:integer):real;
2 Begin
3 If (n=1) then u:=pi/2
4     else u:=(1-0.5/(n-1))*u(n-1);
5 end;
```

### EXERCICE 3

1) • Soit  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  un élément de  $E$ .

$$f(P) = X^{2n+1} P \left( \frac{1}{X} \right) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k \left( X^{2n+1} \times \frac{1}{X^k} \right) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^{2n+1-k}.$$

Un petit changement d'indice donne alors :  $f(P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k$ . Ainsi  $f(P)$  est un élément de  $E$ .

$f$  est une application de  $E$  dans  $E$ .

Soit  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$ ,  $X^k$  un élément de  $E$ .  $f(P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^{2n+1-k} = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k$ .

Dans la suite nous nous appuierons sur cela pour nous éviter de parler de  $P \left( \frac{1}{X} \right) \dots$

• Soient  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  et  $Q = \sum_{k=0}^{2n+1} b_k X^k$  deux éléments de  $E$ . Soit  $\lambda$  un réel.  $\lambda P + Q = \sum_{k=0}^{2n+1} (\lambda a_k + b_k) X^k$ .

$$\text{Ainsi : } f(\lambda P + Q) = \sum_{k=0}^{2n+1} (\lambda a_{2n+1-k} + b_{2n+1-k}) X^k = \lambda \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k + \sum_{k=0}^{2n+1} b_{2n+1-k} X^k = \lambda f(P) + f(Q).$$

$f$  est donc linéaire.  $f$  est alors une application linéaire de  $E$  dans  $E$ . Par conséquent :

$f$  est un endomorphisme de  $E$ .

2) a) Soit  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  un élément de  $E$ .  $f(P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k$ .

$$\text{Donc } f(f(P)) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-(2n+1-k)} X^k = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k = P.$$

$\forall P \in E$ ,  $(f \circ f)(P) = f(f(P)) = P$ . Ainsi :

$f \circ f = Id$ .

b)  $X^2 - 1$  est un polynôme annulateur de  $f$  dont les zéros sont  $-1$  et  $1$ . Le spectre de  $f$  est donc contenu dans  $\{-1, 1\}$ .

1 et  $-1$  sont les seules valeurs propres possibles de  $f$ .

**3) a)** Nous ne commencerons pas à supposer que  $P$  est dans  $\text{Ker}(f - Id)$ . Nous donnerons directement, et pour le même prix une condition nécessaire et suffisante pour que  $P$  soit dans  $\text{Ker}(f - Id)$ .

$$\text{Soit } P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k \text{ un élément de } E. \quad f(P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k.$$

$$P \in \text{Ker}(f - Id) \iff P = f(P) \iff \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k \iff \forall k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k}.$$

Observons alors que :  $(n+1, 2n+1 - (n+1)) = (2n+1 - n, n)$ ,  $(n+2, 2n+1 - (n+2)) = (2n+1 - (n-1), n-1)$ , ...,  $(2n+1, 2n+1 - (2n+1)) = (2n+1 - 0, 0)$ .

Ce qui permet de dire que les  $n+1$  dernières équations du système précédent se déduisent des  $n+1$  premières.

$$\text{Illustrons !!} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_0 = a_{2n+1} \\ a_1 = a_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n-1} = a_{n+2} \\ a_n = a_{n+1} \\ a_{n+1} = a_n \\ a_{n+2} = a_{n-1} \\ \dots\dots\dots \\ a_{2n+1} = a_0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} a_0 = a_{2n+1} \\ a_1 = a_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ a_1 = a_{2n} \\ a_n = a_{n+1} \end{array} \right. \quad . \text{ C'est mieux comme cela Elisa ?}$$

$$\text{Ainsi } P \in \text{Ker}(f - Id) \iff \forall k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k} \iff \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k}.$$

Un élément  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  de  $E$  est un élément de  $\text{Ker}(f - Id)$  si et seulement si  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k}$ .

**b)** Soit  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  un élément de  $\text{Ker}(f - Id)$ . Alors  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k}$  et même  $\forall k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket, a_k = a_{2n+1-k}$ .

$$\text{Donc } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k + \sum_{k=n+1}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k + \sum_{k=0}^n a_k X^{2n+1-k} = \sum_{k=0}^n a_k (X^k + X^{2n+1-k}).$$

Alors  $P$  appartient à  $\text{Vect}(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$ .

Ceci permet de dire que  $\text{Ker}(f - Id) \subset \text{Vect}(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$ .

De plus  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(X^k + X^{2n+1-k}) = X^{2n+1-k} + X^{2n+1-(2n+1-k)} = X^k + X^{2n+1-k}$ .

Donc  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, X^k + X^{2n+1-k} \in \text{Ker}(f - Id)$ . Ainsi  $\text{Vect}(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1}) \subset \text{Ker}(f - Id)$ .

Finalement  $\text{Ker}(f - Id) = \text{Vect}(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$  et alors  $(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$  est une famille génératrice de  $\text{Ker}(f - Id)$ .

$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \deg(X^k + X^{2n+1-k}) = 2n+1-k$ , donc les éléments de la famille  $(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$  sont des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts.

Ainsi  $(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$  est une famille libre de  $\text{Ker}(f - Id)$ . Finalement :

$(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1})$  est une base de  $\text{Ker}(f - Id)$ .

4) Soit  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  un élément de  $\text{Ker}(f + Id)$ .

$$f(P) = -P \text{ donc } \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k = - \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k. \text{ Alors : } \forall k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket, a_k = -a_{2n+1-k}.$$

$$\text{Donc } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=n+1}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=0}^n a_k X^{2n+1-k} = \sum_{k=0}^n a_k (X^k - X^{2n+1-k}).$$

Alors  $P$  appartient à  $\text{Vect}(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$ .

Ceci permet de dire que  $\text{Ker}(f + Id) \subset \text{Vect}(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$ .

$$\text{De plus } \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(X^k - X^{2n+1-k}) = X^{2n+1-k} - X^{2n+1-(2n+1-k)} = X^{2n+1-k} - X^k = -(X^k - X^{2n+1-k}).$$

Donc  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, X^k - X^{2n+1-k} \in \text{Ker}(f + Id)$ . Ainsi  $\text{Vect}(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1}) \subset \text{Ker}(f + Id)$ .

Finalement  $\text{Ker}(f + Id) = \text{Vect}(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$  et  $(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$  est une famille génératrice de  $\text{Ker}(f + Id)$ .

$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \deg(X^k - X^{2n+1-k}) = 2n+1-k$ , donc les éléments de la famille  $(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$  sont des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts.

Ainsi  $(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1})$  est une famille libre de  $\text{Ker}(f - Id)$ . Finalement :

$$\boxed{(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1}) \text{ est une base de } \text{Ker}(f - Id).$$

5) a) Dans cette section  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k, Q = \sum_{k=0}^{2n+1} b_k X^k, R = \sum_{k=0}^{2n+1} c_k X^k$  sont trois éléments de  $E$  et  $\lambda$  est un réel.

$$\bullet \varphi(\lambda P + Q, R) = \sum_{k=0}^{2n+1} ((\lambda a_k + b_k) c_k) = \sum_{k=0}^{2n+1} (\lambda a_k c_k + b_k c_k) = \lambda \sum_{k=0}^{2n+1} a_k c_k + \sum_{k=0}^{2n+1} b_k c_k = \lambda \varphi(P, R) + \varphi(Q, R).$$

$$\varphi(\lambda P + Q, R) = \lambda \varphi(P, R) + \varphi(Q, R) \quad (\text{i}).$$

$$\bullet \varphi(Q, P) = \sum_{k=0}^{2n+1} b_k a_k = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k b_k = \varphi(P, Q). \quad \varphi(Q, P) = \varphi(P, Q) \quad (\text{ii}).$$

$$\bullet \varphi(P, P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k a_k = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k^2 \geq 0 \quad (\text{iii}).$$

• Supposons que  $\varphi(P, P) = 0$ .

Alors  $\sum_{k=0}^{2n+1} a_k^2 = 0$ . Ce qui donne  $a_0^2 = a_1^2 = \dots = a_{2n+1}^2 = 0$  car  $a_0^2, a_1^2, \dots, a_{2n+1}^2$  sont des réels positifs ou nuls.

Donc  $a_0 = a_1 = \dots = a_{2n+1} = 0$ . Ainsi  $P$  est nul.

Si  $\varphi(P, P) = 0$  alors  $P$  est nul (iv).

(i), (ii), (iii) et (iv) montrent que :

$$\boxed{\varphi \text{ est un produit scalaire défini sur } E.}$$

b)  $P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k$  et  $Q = \sum_{k=0}^{2n+1} b_k X^k$  sont deux éléments de  $E$ .  $f(P) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} X^k$  et  $f(Q) = \sum_{k=0}^{2n+1} b_{2n+1-k} X^k$ .



$$\text{Ainsi } \varphi(f(P), Q) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_{2n+1-k} b_k = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i b_{2n+1-i} = \varphi(P, f(Q)). \quad \varphi(f(P), Q) = \varphi(P, f(Q)).$$

$f$  est un endomorphisme symétrique de  $E$ .

c)  $f$  est un endomorphisme symétrique de  $E$  donc  $f$  est diagonalisable.

Nous avons vu plus haut que les deux valeurs propres possibles de  $f$  sont 1 et  $-1$ . Nous avons également vu que :

$$\text{Ker}(f - Id) = \text{Vect}(1 + X^{2n+1}, X + X^{2n}, \dots, X^n + X^{n+1}) \text{ et } \text{Ker}(f + Id) = \text{Vect}(1 - X^{2n+1}, X - X^{2n}, \dots, X^n - X^{n+1}).$$

Ainsi  $\text{Ker}(f - Id)$  et  $\text{Ker}(f + Id)$  ne sont pas réduits au vecteur nul ; 1 et  $-1$  sont des valeurs propres de  $f$ .

Finalement 1 et  $-1$  sont les valeurs propres de  $f$ . Comme  $f$  est diagonalisable,  $\text{Ker}(f - Id)$  et  $\text{Ker}(f + Id)$  sont supplémentaires.

De plus  $f$  est symétrique donc ses sous-espaces propres sont orthogonaux. Alors  $\text{Ker}(f - Id)$  et  $\text{Ker}(f + Id)$  sont orthogonaux. Finalement :

$\text{Ker}(f + Id)$  et  $\text{Ker}(f - Id)$  sont supplémentaires orthogonaux dans  $E$ .

$\nabla$  Remarque Ceci indique que  $\text{Ker}(f + Id)$  est l'orthogonal de  $\text{Ker}(f - Id)$ .

Or  $f$  est un endomorphisme involutif de  $E$  donc  $f$  est la symétrie vectorielle par rapport à  $\text{Ker}(f - Id)$  dans la direction  $\text{Ker}(f + Id)$ .

Finalement  $f$  est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à  $\text{Ker}(f - Id)$ .  $\nabla$

## PROBLÈME

### Partie 1 : Préliminaire

Dans toute cette partie  $x$  est un élément de  $[0, 1[$ .

1) a) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$  et soit  $t$  un élément de  $[0, x]$ .  $t$  est différent de 1 donc  $\sum_{p=1}^n t^{p-1} = \frac{1-t^n}{1-t}$ .

Si  $n$  appartient à  $\mathbb{N}^*$  et si  $t$  appartient à  $x$  :  $\sum_{p=1}^n t^{p-1} = \frac{1-t^n}{1-t}$ .

b) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .  $\forall t \in [0, x]$ ,  $\sum_{p=1}^n t^{p-1} = \frac{1-t^n}{1-t}$ .

En intégrant on obtient :  $\int_0^x \sum_{p=1}^n t^{p-1} dt = \int_0^x \frac{1-t^n}{1-t} dt$ . Ce qui donne par linéarité de l'intégrale :

$$\sum_{p=1}^n \int_0^x t^{p-1} dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t} - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt. \text{ Alors } \sum_{p=1}^n \left[ \frac{t^p}{p} \right]_0^x = [-\ln|1-t|]_0^x - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{p=1}^n \frac{x^p}{p} = -\ln|1-x| - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt = -\ln(1-x) - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{p=1}^n \frac{x^p}{p} = -\ln(1-x) - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt.$$

c) Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .  $\forall t \in [0, x]$ ,  $0 \leq \frac{1}{1-t} \leq \frac{1}{1-x}$  et  $t^n \geq 0$  donc  $\forall t \in [0, x]$ ,  $0 \leq \frac{t^n}{1-t} \leq \frac{t^n}{1-x}$ .

$x$  étant un élément de  $[0, 1[$ , il vient en intégrant :

$$0 \leq \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt \leq \int_0^x \frac{t^n}{1-x} dt = \frac{1}{1-x} \int_0^x t^n dt = \frac{1}{1-x} \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x = \frac{1}{1-x} \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{(1-x)(n+1)}.$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-x)(n+1)} = 0$ . Par encadrement on obtient alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt = 0.$$

d) Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^n \frac{x^p}{p} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( -\ln(1-x) - \int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt \right) = -\ln(1-x)$ . Ainsi :

$$\text{la série de terme général } \frac{x^p}{p} \text{ converge et } \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{x^p}{p} = -\ln(1-x).$$

*Exercice* Montrer que le résultat vaut encore pour  $x \in [-1, 0[$ .

2) a)  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$ . Donc  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = \frac{x^{n+1}}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}$ .

$$\text{Alors } \forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x \frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Les séries de termes généraux  $\frac{x^n}{n}$  et  $\frac{x^{n+1}}{n+1}$  étant convergentes, la série de terme général  $\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$  converge comme combinaison linéaire de deux séries convergentes.

$$\text{La série de terme général } \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \text{ est convergente.}$$

b)  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)}$  car les trois séries convergent.

$$\text{Donc } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x(-\ln(1-x)) - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)} = -x \ln(1-x) - \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{x^p}{p}.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = -x \ln(1-x) - \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{x^p}{p} + x = -x \ln(1-x) - (-\ln(1-x)) + x = x + (1-x) \ln(1-x).$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x + (1-x) \ln(1-x).$$

## Partie 2

1) Rappelons que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $0 \leq F(x) \leq 1$ .

Supposons qu'il existe un réel  $x_0$  tel que  $F(x_0) = 1$ .  $F$  étant croissante sur  $\mathbb{R} : \forall x \in [x_0, +\infty[, F(x) = 1 !!$

$f$  est continue sur  $]0, +\infty[$ . Donc  $F$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et  $\forall x \in ]0, +\infty[, F'(x) = f(x)$ .

Or  $f$  est strictement positive sur  $]0, +\infty[$  donc sur  $]0, +\infty[$ . Par conséquent  $F$  est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$  (et même sur  $[0, +\infty[$  car  $F$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ).

$F$  étant strictement croissante sur  $]0, +\infty[$  et constante sur  $[x_0, +\infty[$ , une légère contradiction apparaît...

Ainsi il n'existe pas de réel  $x_0$  tel que  $F(x_0) = 1$ . Donc  $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) < 1$ . Alors :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, 1 - F(x) > 0.}$$

2) Il convient de montrer que  $g$  est positive sur  $\mathbb{R}$ , continue sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points et que  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt$  existe et vaut 1. Une remarque préliminaire s'impose.

$f$  étant nulle sur  $] - \infty, 0[ : \forall x \in ] - \infty, 0[, F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 0$ .

Alors  $\forall x \in ] - \infty, 0[, -f(x) \ln(1 - F(x)) = -f(x) \ln(1) = 0 = g(x)$ . Plus de doute :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = -f(x) \ln(1 - F(x)).}$$

• Soit  $x$  un réel.

$0 < 1 - F(x) \leq 1$  donc  $\ln(1 - F(x)) \leq 0$ .  $f(x) \geq 0$  donc  $-f(x) \leq 0$ . Alors  $g(x) = -f(x) \ln(1 - F(x)) \geq 0$ .

Finalement  $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq 0$ .

•  $x \rightarrow 1 - F(x)$  est continue et strictement positive sur  $\mathbb{R}$  et  $\ln$  est continue sur  $\mathbb{R}^{+*}$ . Alors  $x \rightarrow \ln(1 - F(x))$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

$f$  est continue sur  $[0, +\infty[$  et sur  $] - \infty, 0[$  donc  $f$  est au moins continue sur  $\mathbb{R}^*$ . Il en est alors de même pour  $-f$ .

Donc, par produit,  $g : x \rightarrow -f(x) \ln(1 - F(x))$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$ .

$g$  est continue sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points.

∇ Remarque Ce qui précède montre que  $g$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}^*$ .

$g$  est aussi continue à droite en 0 car  $-f$  et  $x \rightarrow \ln(1 - F(x))$  sont continues sur  $[0, +\infty[$ .

Notons que  $F(0) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt = 0$ . Alors  $g(0) = -f(0) \ln(1 - 0) = 0$ . Rappelons que  $g$  est nulle sur  $] - \infty, 0[$ .

Alors :  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0 = g(0)$  donc  $g$  est continue à gauche en 0.

Finalement  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$ . ∇

•  $g$  est nulle sur  $] - \infty, 0[$  donc  $\int_{-\infty}^0 g(t) dt$  existe et vaut 0.

Montrons alors que  $\int_0^{+\infty} g(t) dt$  existe et vaut 1. Cela revient à montrer que  $\int_0^{+\infty} (-f(t)) \ln(1 - F(t)) dt$  existe et vaut 1. Utilisons pour cela une intégration par parties.

Soit  $H$  la restriction de  $F$  à  $[0, +\infty[$ .  $\forall x \in [0, +\infty[, H(x) = \int_0^x f(t) dt$  et  $f$  est continue sur  $[0, +\infty[$  donc  $H$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, +\infty[$  et  $\forall x \in [0, +\infty[, H'(x) = f(x)$ .

∇ Remarque L'utilisation de  $H$  s'impose (!) car  $F$  n'est pas nécessairement dérivable en 0 ;  $F'(x) = f(x)$  est donc un peu osé pour  $x = 0$ ... ∇

Posons  $\forall x \in [0, +\infty[$ ,  $u(x) = 1 - H(x)$ .  $u$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, +\infty[$  et  $\forall x \in [0, +\infty[$ ,  $u'(x) = -f(x)$ .

Posons  $\forall x \in [0, +\infty[$ ,  $v(x) = \ln(1 - H(x))$ .  $x \rightarrow 1 - H(x)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, +\infty[$  et strictement positive. Comme  $\ln$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^{+,*}$ , par composition  $v$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, +\infty[$ .  $\forall x \in [0, +\infty[$ ,  $v'(x) = \frac{-f(x)}{1 - H(x)}$ .

Soit  $A$  un réel strictement positif. En utilisant une intégration par parties (justifiée par ce qui précède) il vient :

$$\int_0^A g(t) dt = \int_0^A \left( -f(t) \ln(1 - H(t)) \right) dt = [(1 - H(x)) \ln(1 - H(x))]_0^A - \int_0^A (1 - H(t)) \frac{-f(t)}{1 - H(t)} dt.$$

$$\int_0^A g(t) dt = (1 - H(A)) \ln(1 - H(A)) - (1 - H(0)) \ln(1 - H(0)) + \int_0^A f(t) dt.$$

$$\int_0^A g(t) dt = (1 - H(A)) \ln(1 - H(A)) - (1 - H(0)) \ln(1 - H(0)) + F(A) - F(0).$$

$$H(0) = F(0) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt = 0 \text{ donc } (1 - H(0)) \ln(1 - H(0)) = \ln 1 = 0.$$

$$\text{Alors } \int_0^A g(t) dt = (1 - H(A)) \ln(1 - H(A)) + F(A).$$

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} (1 - H(A)) = \lim_{A \rightarrow +\infty} (1 - F(A)) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) = 0 \text{ donc } \lim_{A \rightarrow +\infty} \left( (1 - H(A)) \ln(1 - H(A)) \right) = 0.$$

$$\text{Comme en plus } \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = 1 : \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A g(t) dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left( (1 - H(A)) \ln(1 - H(A)) + F(A) \right) = 1.$$

Ainsi  $\int_0^{+\infty} g(t) dt$  existe et vaut 1.

Ceci achève de montrer que  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt$  existe et vaut 1.

$g$  est positive sur  $\mathbb{R}$ ,  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points et  $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt$  existe et vaut 1. Alors  $g$  est une densité de probabilité donc :

$g$  peut être considérée comme la densité d'une variable aléatoire  $Y$ .

**3) a)** Soit  $X_0$  une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ .

$$\text{Posons } \forall x \in \mathbb{R}, f_0(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \in [0, +\infty[ \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

$f_0$  est une densité de  $X_0$ , continue et strictement positive sur  $[0, +\infty[$  et nulle sur  $] -\infty, 0[$ . Ainsi :

une variable aléatoire  $X_0$  suivant une loi exponentielle vérifie les conditions imposées dans cette partie.

**b)** Ici  $X$  suit la loi exponentielle de paramètre  $\lambda$  alors  $f_0$  est encore une densité de  $X$ .  $f$  et  $f_0$  sont donc deux densités de  $X$  !

$\nabla$  Remarque À priori (à priori seulement), rien ne permet de dire que  $f$  est  $f_0$ ...  $\nabla$

$$\text{Posons } \forall x \in \mathbb{R}, g_0(x) = \begin{cases} -f_0(x) \ln(1 - F(x)) & \text{si } x \in [0, +\infty[ \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

$f$  et  $f_0$  diffèrent seulement en un nombre fini de points il en est alors de même de  $g$  et  $g_0$ .

Comme  $g_0$  est positive sur  $\mathbb{R}$  et que  $g$  est une densité de  $Y$ ,  $g_0$  est encore une densité de  $Y$  !

$$\forall x \in [0, +\infty[, g_0(x) = -\lambda e^{-\lambda x} \ln(1 - (1 - e^{-\lambda x})) = -\lambda e^{-\lambda x} \ln(e^{-\lambda x}) = (-\lambda)(-\lambda x) e^{-\lambda x} = \frac{x^{2-1} e^{-\frac{x}{(1/\lambda)}}}{(1/\lambda)^2 \Gamma(2)}.$$

De plus  $\forall x \in ]-\infty, 0[, g_0(x) = 0$ .

Alors  $Y$  suit la loi Gamma de paramètres  $\frac{1}{\lambda}$  et 2. Ainsi  $E(Y) = \frac{2}{\lambda}$  et  $V(Y) = \frac{2}{\lambda^2}$ .

$Y$  suit la loi Gamma de paramètres  $\frac{1}{\lambda}$  et 2,  $E(Y) = \frac{2}{\lambda}$  et  $V(Y) = \frac{2}{\lambda^2}$ .

*Exercice* Montrer que  $f = f_0$  ! En déduire que ceux qui n'ont pas pris de précaution avaient raison... ! Comme disait ma grand-mère il n'y a de la chance que pour la canaille...

---

**Partie 3**


---

1)  $\forall r \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{n=1}^r u_n = \sum_{n=1}^r \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^r \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{r+1}$ . Alors  $\lim_{r \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^r u_n = 1$ .

La série de terme général  $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$  converge et  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = 1$ .

2) a) Soit  $x$  un réel. Montrons que  $Z^{-1}(]-\infty, x]) \in \mathcal{A}$ .

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} = \{\omega \in \Omega \mid \text{Max}(X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_{N(\omega)}(\omega)) \leq x\}.$$

Comme  $(\{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\})_{n \in \mathbb{N}^*}$  est un système complet d'événements de  $(\Omega, \mathcal{A}, P) : \Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\}$ .

$$\text{Alors : } Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (Z^{-1}(]-\infty, x]) \cap \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\}.$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (\{\omega \in \Omega \mid \text{Max}(X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_{N(\omega)}(\omega)) \leq x\} \cap \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\}).$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{\omega \in \Omega \mid \text{Max}(X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_{N(\omega)}(\omega)) \leq x \text{ et } N(\omega) = n\}.$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{\omega \in \Omega \mid \text{Max}(X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \leq x \text{ et } N(\omega) = n\}.$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{\omega \in \Omega \mid X_0(\omega) \leq x, X_1(\omega) \leq x, \dots, X_n(\omega) \leq x, N(\omega) = n\}.$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (\{\omega \in \Omega \mid X_0(\omega) \leq x\} \cap \{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) \leq x\} \cap \dots \cap \{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \leq x\} \cap \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\}).$$

$$Z^{-1}(]-\infty, x]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (X_0^{-1}(]-\infty, x]) \cap X_1^{-1}(]-\infty, x]) \cap \dots \cap X_n^{-1}(]-\infty, x]) \cap N^{-1}(\{n\}).$$

Soit  $n$  un élément de  $\mathbb{N}^*$ .

$X_0, X_1, \dots, X_n, N$  sont des variables aléatoires sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  donc  $X_0^{-1}(]-\infty, x]), X_1^{-1}(]-\infty, x]), \dots, X_n^{-1}(]-\infty, x]), N^{-1}(\{n\})$  sont des éléments de la tribu  $\mathcal{A}$ .

Alors  $X_0^{-1}(]-\infty, x]) \cap X_1^{-1}(]-\infty, x]) \cap \dots \cap X_n^{-1}(]-\infty, x]) \cap N^{-1}(\{n\})$  est un élément de  $\mathcal{A}$  ( $\mathcal{A}$  est stable par intersection finie ou dénombrable).

Ainsi  $Z^{-1}(]-\infty, x])$  est réunion dénombrable d'éléments de la tribu  $\mathcal{A}$  c'est donc un élément de  $\mathcal{A}$  et ceci pour tout élément  $x$  de  $\mathbb{R}$ .

Ceci achève de montrer que :

$X$  est une variable aléatoire sur  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .

Soit  $x$  un réel.  $F_Z(x) = P(Z \leq x) = P(Z^{-1}(]-\infty, x]))$ .

$$F_Z(x) = P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (X_0^{-1}(]-\infty, x]) \cap X_1^{-1}(]-\infty, x]) \cap \dots \cap X_n^{-1}(]-\infty, x]) \cap N^{-1}(\{n\})\right).$$

Par indépendance et incompatibilité il vient :

$$F_Z(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( P(X_0^{-1}(] - \infty, x]) P(X_1^{-1}(] - \infty, x]) \cdots P(X_n^{-1}(] - \infty, x]) P(N^{-1}\{n\}) \right).$$

$$F_Z(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( P(X_0 \leq x) P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) P(N = n) \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( (F(x))^{n+1} u_n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(F(x))^{n+1}}{n(n+1)}.$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_Z(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(F(x))^{n+1}}{n(n+1)}.$$

b) Soit  $x$  un élément de  $\mathbb{R}$ .

$$F(x) \in [0, 1[ \text{ donc, d'après le préliminaire : } F_Z(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(F(x))^{n+1}}{n(n+1)} = F(x) + (1 - F(x)) \ln(1 - F(x))$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_Z(x) = F(x) + (1 - F(x)) \ln(1 - F(x))$$

Pour faire plaisir au concepteur :

$$\forall x \in [0, +\infty[, F_Z(x) = F(x) + (1 - F(x)) \ln(1 - F(x))$$

c) • Nous avons déjà vu que  $F$ ,  $x \rightarrow 1 - F(x)$  et  $x \rightarrow \ln(1 - F(x))$  sont continues sur  $\mathbb{R}$ .

Alors  $x \rightarrow F(x) + (1 - F(x)) \ln(1 - F(x))$  est continue sur  $\mathbb{R}$ . Par conséquent  $F_Z$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

•  $f$  est continue au moins sur  $\mathbb{R}^*$  donc  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  au moins sur  $\mathbb{R}^*$  et  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $F'(x) = f(x)$ .

$1 - F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et strictement positive sur  $\mathbb{R}$ . Comme  $\ln$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^{+*}$ ,  $\ln(1 - F)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Par produit  $(1 - F) \ln(1 - F)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Par somme  $F + (1 - F) \ln(1 - F)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

Ainsi  $F_Z$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  donc sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points.

$F_Z$  est donc continue sur  $\mathbb{R}$  et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points donc :

$Z$  est une variable aléatoire à densité

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, F'_Z(x) = f(x) - f(x) \ln(1 - F(x)) + (1 - F(x)) \frac{-f(x)}{1 - F(x)} = -f(x) \ln(1 - F(x)) = g(x).$$

Alors  $g$  est positive sur  $\mathbb{R}$  et coïncide avec  $F'_Z$  sur  $\mathbb{R}^*$  donc sur  $\mathbb{R}$  privé d'un ensemble fini de points. Ainsi :

$g$  est une densité de  $Z$ .