

# ANALYSE

---

**Exercice 1.1.**

Soit  $f : D = (\mathbb{R}_+^*)^3 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$f(x, y, z) = x \ln(x) + y \ln(y) + z \ln(z)$$

1. La fonction  $f$  est-elle minorée, majorée, bornée sur  $D$  ?
2. Justifier que la fonction  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $D$ .

Soit  $a$  un réel strictement positif. On considère l'ensemble

$$\mathcal{C}_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 3a\}$$

et on note  $g = f|_{\mathcal{C}_a}$  la restriction de  $f$  à  $\mathcal{C}_a$ .

3. Montrer que si  $g$  admet un extremum local au point  $(x, y, z)$ , alors :

$$1 + \ln(x) = 1 + \ln(y) = 1 + \ln(z)$$

4. Étudier l'existence des extremums locaux de  $g$ . Comparer la (les) valeur(s) obtenue(s) à celle(s) trouvée(s) à la première question.
5. Retrouver les extremums de  $g$  en se ramenant à l'étude des extremums d'une fonction de deux variables bien choisie.

---

**Solution :**

1. Soit la fonction  $\varphi : x \mapsto x \ln x$ . Alors  $\varphi'(x) = 1 + \ln x$  et donc :

$x$	0	1/e	$+\infty$	(on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 0$ )
$\varphi'(x)$		-	0	+
$\varphi$	0	$\searrow$	-1/e	$\nearrow$ $+\infty$

$\varphi$  décroît sur  $]0, 1/e[$  de 0 à  $-1/e$ , puis croît sur  $[1/e, +\infty[$  de  $-1/e$  à  $+\infty$ . Ainsi  $f$  est non majorée sur  $D$  et :

$$\min_D f = -3/e.$$

2. La fonction  $f$  est clairement de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $D$  ouvert.

On a par exemple  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 1 + \ln x$ .

3. On cherche ici à déterminer un extremum sous contrainte linéaire. La condition nécessaire d'extremum en  $M$  sous contrainte linéaire est :

$$\overline{\text{grad}}_M(f) \in V^\perp$$

où  $V$  est l'espace vectoriel associé à  $\mathcal{C}_a$ . Comme  $V^\perp$  est la droite engendrée par le vecteur  $(1, 1, 1)$ , cela revient à dire que le gradient a ses trois coordonnées égales, d'où la relation demandée.

4. Le seul point candidat est donc le point  $(a, a, a)$ . On utilise ensuite un développement limité :

$$\begin{aligned} g(a+u, a+v, a+w) &= (a+u) \left[ \ln a + \ln \left( 1 + \frac{u}{a} \right) \right] + \dots \\ &= 3a \ln a + (u+v+w)(1 + \ln a) \\ &\quad + \frac{1}{2a}(u^2 + v^2 + w^2) + o(u^2 + v^2 + w^2) \end{aligned}$$

Or  $(a+u, a+v, a+w) \in \mathcal{C}_a \implies u+v+w=0$ , d'où

$$g(a+u, a+v, a+w) - g(a, a, a) \geq 0 \text{ pour } (u, v, w) \text{ « assez petit ».}$$

$g$  possède un minimum (local) en  $(a, a, a)$ , valant  $3a \ln a$ .

On remarque que  $\min_{\mathcal{C}_a} g = 3\varphi(a) \geq 3 \min \varphi = -3/e = \min_D f$  ce qui est cohérent.

5. Avec  $z = 3a - x - y$ , il vient :

$$g(x, y, z) = h(x, y) = x \ln(x) + y \ln(y) + (3a - x - y) \ln(3a - x - y)$$

et :

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = \ln x - \ln(3a - x - y) \\ \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = \ln y - \ln(3a - x - y) \end{cases}$$

Les points critiques de  $h$  vérifient : 
$$\begin{cases} \ln x - \ln(3a - x - y) = 0 \\ \ln y - \ln(3a - x - y) = 0 \end{cases}$$

Soit : 
$$\begin{cases} x = 3a - x - y \\ y = 3a - x - y \end{cases}$$
 et il n'y a qu'une solution :  $x = y = a$ .

Puis :

$$r = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{3a - x - y} ; t = \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}(x, y) = \frac{1}{y} + \frac{1}{3a - x - y}$$

$$s = \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{1}{3a - x - y}$$

D'où en  $(a, a)$  :  $rt - s^2 = \frac{2}{a} \times \frac{2}{a} - \left(\frac{1}{a}\right)^2 > 0$ , et, comme  $r > 0$ ,  $h$  admet en  $(a, a)$  un minimum local.

### Exercice 1.2.

1. Justifier que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , l'intégrale  $\int_0^1 (\ln(1+x))^n dx$  existe.

On la note  $I_n$ .

2. Montrer que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente. Déterminer sa limite.

3. Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on a :

$$I_{n+1} = 2(\ln 2)^{n+1} - (n+1)I_n$$

4. a) Soit  $\varepsilon \in ]0, 1[$ . Établir la majoration :

$$I_n \leq [\ln(2 - \varepsilon)]^n + \varepsilon(\ln 2)^n$$

b) En choisissant judicieusement  $\varepsilon$  (qui peut dépendre de  $n$ ), montrer que :

$$I_n = o((\ln 2)^n)$$

5. Dédurre des questions précédentes un équivalent de  $I_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

6. Montrer que la série de terme général  $\frac{I_n}{n!}$  est convergente et calculer sa somme.

### Solution :

1. La fonction  $x \mapsto (\ln(1+x))^n$  est continue sur  $[0, 1]$  ; l'intégrale  $I_n$  existe donc.

2. Pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $0 \leq \ln(1+x) \leq \ln 2 < 1$ . La suite  $((\ln(1+x))^n)_n$  est donc positive, décroissante et par croissance de l'opérateur « intégration

sur  $[0, 1]$  », la suite  $(I_n)_n$  est positive décroissante. Elle converge donc et sa limite est 0 puisque :

$$0 < I_n \leq (\ln 2)^n.$$

3. Une intégration par parties en prenant  $x \mapsto x + 1$  comme primitive de  $x \mapsto 1$  donne :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 1 \times (\ln(1+x))^{n+1} dx \\ I_{n+1} &= \left[ (x+1)(\ln(1+x))^{n+1} \right]_0^1 - (n+1) \int_0^1 (\ln(1+x))^n dx \\ &= 2(\ln 2)^{n+1} - (n+1)I_n. \end{aligned}$$

4. a) Soit  $\varepsilon \in ]0, 1[$ . On a :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{1-\varepsilon} (\ln(1+x))^n dx + \int_{1-\varepsilon}^1 (\ln(1+x))^n dx \\ &\leq (\ln(2-\varepsilon))^n (1-\varepsilon) + (\ln 2)^n \varepsilon \\ &\leq [\ln(2-\varepsilon)]^n + \varepsilon (\ln 2)^n. \end{aligned}$$

b) Choisissons  $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$  et posons  $a_n = \frac{[\ln(2-\varepsilon_n)]^n}{(\ln 2)^n}$ . Il vient :

$$\ln a_n = \ln \left( \frac{[\ln(2-\varepsilon_n)]^n}{(\ln 2)^n} \right) = n \ln \left( \frac{\ln(2-\varepsilon_n)}{\ln 2} \right) \underset{(\infty)}{\sim} n \left[ \frac{\ln(2-\varepsilon_n)}{\ln 2} - 1 \right]$$

Soit :

$$\ln(a_n) \underset{(\infty)}{\sim} \frac{n}{\ln 2} \ln \left( 1 - \frac{\varepsilon_n}{2} \right) \underset{(\infty)}{\sim} -\frac{n\varepsilon_n}{2\ln 2}$$

Ainsi  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = -\infty$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Il existe donc  $n_0$  tel que pour  $n \geq n_0$ ,  $\frac{[\ln(2-\varepsilon_n)]^n}{(\ln 2)^n} \leq \varepsilon$  et ainsi :

$$n \geq n_0 \implies \frac{I_n}{(\ln 2)^n} \leq 2\varepsilon, \text{ d'où}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{(\ln 2)^n} = 0, \text{ soit : } I_n = o((\ln 2)^n)$$

5. La relation de récurrence obtenue à la question 3, donne :

$$I_{n+1} = 2(\ln 2)^{n+1} - (n+1)I_n = o((\ln 2)^{n+1})$$

Donc  $(n+1)I_n \sim 2(\ln 2)^{n+1}$ , et :

$$I_n \sim \frac{2(\ln 2)^{n+1}}{n+1}$$

6. La série  $\sum \frac{I_n}{n!}$  converge car  $0 \leq \frac{I_n}{n!} \leq \frac{(\ln 2)^n}{n!}$ . La relation démontrée lors de la question 3 donne, pour tout  $k \geq 1$  :

$$\frac{I_k}{k!} + \frac{I_{k-1}}{(k-1)!} = \frac{2(\ln 2)^k}{k!}$$

En sommant ces relations de 1 à  $n$ , il vient :

$$\frac{I_n}{n!} + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{I_k}{k!} + I_0 = 2 \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^k}{k!}$$

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{n!} = 0$ , on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{I_k}{k!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^k}{k!} - I_0 = 2(e^{\ln 2} - 1) + 1$$

Soit :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{I_k}{k!} = \frac{3}{2}$$

### Exercice 1.3.

Soit  $f$  l'application définie par :

$$f : x \mapsto \int_0^1 (1 - t^2)^x dt.$$

1. Déterminer le domaine de définition  $D$  de  $f$ .

*On admet que  $f$  est continue sur  $D$ .*

2. Montrer que  $f$  est décroissante sur  $D$ .

3. À l'aide d'une intégration par parties, déterminer, pour tout  $x$  de  $D$ , une relation entre  $f(x+1)$  et  $f(x)$ .

4. a) En déduire un équivalent de  $f(x)$ , lorsque  $x$  tend vers  $-1$  par valeurs supérieures.

b) Montrer que lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ ,  $f(x+1)$  et  $f(x)$  sont équivalents.

5. a) Soit  $n = \lfloor x \rfloor$  (partie entière de  $x$ ). Montrer que lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ , on a  $f(x) \sim f(n)$ .

b) Montrer que, lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ ,  $f(x) \sim Cx^{-1/2}$ , où  $C$  est une constante qu'on ne demande pas de déterminer.

(on pourra étudier la série de terme général  $\ln \left( \frac{f(n-1)}{f(n)} \right)$ .)

**Solution :**

1. L'application  $t \mapsto e^{x \ln(1-t^2)}$  est continue sur l'intervalle  $[0, 1[$ .

Au voisinage gauche de 1 (pour  $t$ ), on a :  $(1-t^2)^x = (1+t)^x(1-t)^x \sim \frac{2^x}{(1-t)^{-x}}$ , et la fonction  $t \mapsto \frac{1}{(1-t)^{-x}}$  est intégrable sur  $[1/2, 1]$  si et seulement si  $x > -1$  (règle de Riemann). Donc :

$$D = ]-1, +\infty[$$

2. Soit  $x, y$  tels que  $-1 < x < y$ . Comme  $\ln(1-t^2) < 0$  sur  $[0, 1[$ , par croissance de la fonction exponentielle, il vient  $e^{x \ln(1-t^2)} > e^{y \ln(1-t^2)}$ , et  $f(x) > f(y)$ . Ainsi  $f$  est décroissante sur  $D$ .

3. On intègre  $t \mapsto 1$  en  $u : t \mapsto t$  et on dérive  $v : t \mapsto (1-t^2)^x$ , les fonctions  $u$  et  $v$  étant de classe  $C^1$  sur  $[0, a]$ , avec  $a < 1$ . Ainsi :

$$f_a(x+1) = \int_0^a (1-t^2)^{x+1} dt = [t(1-t^2)^{x+1}]_0^a + (x+1) \int_0^a 2t^2(1-t^2)^x dt$$

En prenant la limite lorsque  $a$  tend vers 1, il vient

$$f(x+1) = 2(x+1) \int_0^1 (t^2 - 1 + 1)(1-t^2)^x dt = -2(x+1)(f(x+1) + f(x))$$

et donc :

$$f(x+1) = \frac{2x+2}{2x+3} f(x)$$

4. a) Pour  $x$  au voisinage de  $-1$ ,  $x+1$  est au voisinage de 0 et par continuité de  $f$  :

$$\lim_{x \rightarrow -1} (2x+2)f(x) = f(0) = 1, \text{ soit :}$$

$$f(x) \underset{(-1+)}{\sim} \frac{1}{2(x+1)}$$

$$\text{b) On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+2}{2x+3} = 1$$

Soit :

$$f(x) \underset{(+\infty)}{\sim} f(x+1)$$

5. a) On sait que  $n \leq x < n+1$ . Par décroissance  $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$ , et comme  $f(n+1) \sim f(n)$  :

$$f(x) \underset{(+\infty)}{\sim} f(\lfloor x \rfloor)$$

$$\text{b) On a } \frac{f(n-1)}{f(n)} = \frac{2n+1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n}, \text{ d'où :}$$

$$\ln \frac{f(n-1)}{f(n)} = \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{2n} + w_n$$

où  $\sum w_n$  est une série absolument convergente.

On somme ces égalités entre 2 et  $n$ . Il vient :

$$\ln f(1) - \ln f(n) = \frac{1}{2} \times \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=2}^n w_k$$

Sachant que  $n \mapsto 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$  est une suite convergente (vers la constante  $\gamma$  d'Euler), on obtient :

$$n \mapsto \ln f(n) - \frac{1}{2} \ln n \text{ est une suite convergente}$$

Donc :

$$\exists C > 0, f(n) \underset{(\infty)}{\sim} \frac{C}{n^{1/2}}$$

et, avec 5. a) :

$$f(x) \underset{(+\infty)}{\sim} Cx^{-1/2}$$

#### Exercice 1.4.

1. Soit  $n$  un entier naturel et  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  quelconque.

a) Montrer que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-t} P(t) dt$  est convergente.

On note alors :  $I(P) = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(t) dt$ .

b) Pour tout entier  $k$  tel que  $0 \leq k \leq n$ , calculer  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k dt$ .

2. Pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , on pose  $a_k(P) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^k P(t) dt$ .

On considère l'application  $\Phi_n$  de  $\mathbb{R}_n[X]$  dans  $\mathbb{R}^{n+1}$  définie par :

$$\Phi_n(P) = (a_0(P), a_1(P), \dots, a_n(P))$$

Montrer que  $\Phi_n$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

3. Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . On note  $P_m$  le polynôme de  $\mathbb{R}_m[X]$  vérifiant :

$$\Phi_m(P_m) = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^{m+1}$$

a) Calculer  $P_1$  et  $P_2$ .

b) Soit  $P'_m$  le polynôme dérivé de  $P_m$ . Montrer que :

$$\Phi_m(P'_m) = (1 - P_m(0), -1, 0, \dots, 0).$$

c) On suppose ici que  $m \geq 2$  et on pose :  $H_{m-1} = P'_m - P'_{m-1} + P_{m-1}$ .  
Montrer que pour tout  $k \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$  :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k H_{m-1}(t) dt = 0$$

Qu'obtient-on pour  $k = m$  ?

d) Pour  $m \geq 2$ , calculer  $H_{m-1}$ . En déduire que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, P'_m(t) = -\left[1 + \sum_{k=1}^{m-1} P_k(t)\right]$$

**Solution :**

1. a) La convergence connue de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} t^{n+2} e^{-t} dt$  implique, par croissances comparées la convergence de  $I(P)$ .

b) On obtient par une récurrence immédiate :

$$I(X^k) = k!$$

2. L'application  $\Phi_n$  est évidemment linéaire.

Soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , si  $\Phi_n(P) = 0$ , on a pour tout  $k$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k P(t) dt =$

0. Par conséquent  $\int_0^{+\infty} e^{-t} P^2(t) dt = 0$ , or c'est l'intégrale d'une fonction continue et positive, la fonction  $e^{-t} P^2(t)$  est donc nulle et par suite  $P$  est le polynôme nul.  $\Phi_n$  est donc injective donc bijective (car les deux espaces vectoriels sont de même dimension finie  $m+1$ ) ; c'est un isomorphisme.

3. a) Les applications  $\Phi_1$  et  $\Phi_2$  étant des isomorphismes on obtient l'existence et l'unicité de  $P_1$  et  $P_2$ . Le calcul donne,  $P_1(t) = 2 - t$  et  $P_2(t) = 3 - 3t + \frac{t^2}{2}$ . De la même manière,  $\Phi_m$  étant un isomorphisme,  $P_m$  existe et est unique.

b) On a successivement,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{+\infty} e^{-t} P_m(t) dt = [P_m(t)(-e^{-t})]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} P'_m(t) dt \\ &= P_m(0) + \int_0^{+\infty} e^{-t} P'_m(t) dt \end{aligned}$$

D'où

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} P'_m(t) dt = 1 - P_m(0)$$

Pour  $k \geq 1$ , on obtient :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k P'_m(t) dt = [t^k e^{-t} P_m(t)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-t} (k t^{k-1} - t^k) P_m(t) dt$$



$$= \begin{cases} -1 & \text{si } k = 1 \\ 0 & \text{si } k \geq 2 \end{cases}$$

car  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k P_m(t) dt = 0$  lorsque  $k \geq 1$ .

On a donc bien

$$\Phi_m(P'_m) = (1 - P_m(0), -1, 0, \dots, 0)$$

c) On a :  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t H_{m-1}(t) dt = -1 + 1 + 0 = 0$ .

Pour  $2 \leq k \leq m-1$ ,  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^k H_{m-1}(t) dt = 0 - 0 + 0 = 0$ .

D'où le résultat.

On a respectivement,  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^m P'_m(t) dt = 0$ , et :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^m P_{m-1}(t) dt &= \int_0^{+\infty} e^{-t} m t^{m-1} P_{m-1}(t) dt + \int_0^{+\infty} e^{-t} t^m P'_{m-1}(t) dt \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} e^{-t} t^m P'_{m-1}(t) dt \end{aligned}$$

On en déduit que  $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^m H_{m-1}(t) dt = 0$ .

d) Il résulte de la question précédente qu'il existe un réel  $\alpha$  tel que

$$\Phi_m(H_{m-1}) = (\alpha, 0, \dots, 0) = \alpha \Phi_m(P_m).$$

D'où, puisque  $\Phi_m$  est un isomorphisme,  $H_{m-1} = \alpha P_m$ , ce qui n'est possible que si  $\alpha = 0$ , en comparant les degrés. Donc  $H_{m-1} = 0$ .

On a donc pour tout  $m \geq 2$ ,  $P'_m = P'_{m-1} - P_{m-1}$ . En tenant compte du fait que  $P'_1 = -1$ , on en déduit par télescopage que,

$$\forall t \in \mathbb{R}, P'_m(t) = -\left[1 + \sum_{k=1}^{m-1} P_k(t)\right]$$

### Exercice 1.5.

1. Exemple introductif.

a) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$  est un entier naturel.

b) En déduire que la série de terme général  $\sin(\pi(2 + \sqrt{3})^n)$  est absolument convergente.

Soit  $P$  un polynôme unitaire de degré 3 à coefficients dans  $\mathbb{N}$ .

On pose :  $P(X) = X^3 + a_1X^2 + a_2X + a_3$ .

On suppose que  $P$  possède trois racines  $x_1, x_2, x_3$  telles que  $|x_1| > 1, |x_2| < 1$  et  $|x_3| < 1$ .

$$\text{On pose : } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = \sigma_1 \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = \sigma_2 \\ x_1x_2x_3 = \sigma_3 \end{cases} .$$

On pose enfin, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$ .

2. a) Exprimer  $a_1, a_2, a_3$  en fonction de  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ .

b) Calculer  $\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$ . En déduire l'expression de  $S_1, S_2$  et  $S_3$  en fonction de  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ .

c) Montrer que pour tout  $p$  de  $\mathbb{N}^*$  :  $S_{p+3} - \sigma_1S_{p+2} + \sigma_2S_{p+1} - \sigma_3S_p = 0$ .

d) En déduire que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ,  $S_n$  est un entier relatif.

3. Déterminer la nature de la série de terme général  $\sin(\pi x_1^n)$ .

---

### Solution :

1. a) Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  :

$$\begin{aligned} (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} [\sqrt{3}^k + (-\sqrt{3})^k] \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2k} 2^{n-2k} \times 3^k \in 2\mathbb{N} \end{aligned}$$

b) Par la question précédente :  $[(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n]\pi \in 2\pi\mathbb{Z}$  et

$$u_n = \sin[\pi(2 + \sqrt{3})^n] = -\sin[\pi(2 - \sqrt{3})^n]$$

De plus, on sait que pour tout  $x \in [0, \pi]$ ,  $0 \leq \sin x \leq x$ . Donc

$$0 \leq -u_n \leq v_n = \pi(2 - \sqrt{3})^n.$$

La série de terme général  $v_n$  converge puisque  $0 < (2 - \sqrt{3}) < 1$  ; la série  $\sum u_n$  converge donc également (et elle est à termes négatifs).

2. a) On factorise le polynôme  $P$  en  $P(X) = (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)$ , puis, en développant cette expression et par unicité de l'écriture d'un polynôme dans une base, il vient :

$$P(X) = X^3 - \sigma_1X^2 + \sigma_2X - \sigma_3 \implies \begin{cases} \sigma_1 = -a_1 \\ \sigma_2 = a_2 \\ \sigma_3 = -a_3 \end{cases}$$

b) Le calcul de  $\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$  donne :  $\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3 = \prod_{1 \leq i \neq j \leq 3} x_i^2 x_j$ .

On a :  $S_1 = \sigma_1$ . En calculant  $\sigma_1^2$ , il vient  $S_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$ , et en calculant  $\sigma_1^3$ , il vient  $S_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3$ .

c) Soit  $p \in \mathbb{N}^*$  et  $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$ . Alors  $x_i^p P(x_i) = 0$ , ce qui est équivalent à :

$$x_i^{p+3} - \sigma_1 x_i^{p+2} + \sigma_2 x_i^{p+1} - \sigma_3 x_i^p = 0.$$

En sommant ces égalités, il vient :

$$S_{p+3} - \sigma_1 S_{p+2} + \sigma_2 S_{p+1} - \sigma_3 S_p = 0$$

d) Procédons par récurrence.

- par la question b),  $S_1, S_2, S_3$  sont des entiers relatifs, comme polynômes en  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ , qui eux mêmes sont des entiers relatifs comme polynômes à coefficients entiers en les entiers  $a_1, a_2, a_3$ .
- On termine par le principe de récurrence, en utilisant la question précédente.

3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Par la question précédente,  $S_n \in \mathbb{Z}$  et  $\pi x_1^n = \pi S_n - \pi(x_2^n + x_3^n)$ .  
Donc :

$$\begin{aligned} |\sin(\pi x_1^n)| &= |\sin(\pi S_n - \pi(x_2^n + x_3^n))| = |\sin(\pi(x_2^n + x_3^n))| \\ &\leq |\pi(x_2^n + x_3^n)| \leq \pi|x_2|^n + \pi|x_3|^n \end{aligned}$$

On conclut en remarquant que  $|x_2| < 1$  et  $|x_3| < 1$ .

### Exercice 1.6.

Soit  $\alpha$  un réel strictement supérieur à 1.

1. Justifier la convergence de l'intégrale :  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$  ;

On pose alors :

$$F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}, G(\alpha) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^\alpha}, H(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha}$$

2. a) Montrer que pour tout  $t \in [0, 1]$ , et tout  $n$  de  $\mathbb{N}$  on a :

$$\frac{1}{1+t^\alpha} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{k\alpha} + R_n(t)$$

où  $R_n$  est une fonction à préciser.

b) Montrer que la série  $\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{1+k\alpha}$  est convergente et exprimer sa somme en fonction de  $G(\alpha)$ .

3. a) En utilisant le changement de variable défini par  $u = t^{1-\alpha}$ , montrer que :

$$H(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} G\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

b) En admettant que  $2a \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 - a^2} = \frac{\pi}{\sin(\pi a)} - \frac{1}{a}$  pour  $a \in ]0, 1[$ , déterminer la valeur de  $F(\alpha)$ .

**Solution :**

1. La fonction  $f : t \rightarrow \frac{1}{1+t^\alpha}$  est définie, positive et continue sur  $]0, +\infty[$ . Comme  $\alpha > 1$  elle se prolonge par continuité en 0 par  $f(0) = 1$  et est équivalente au voisinage de  $+\infty$  à  $\frac{1}{t^\alpha}$ .

Or  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  est convergente, puisque  $\alpha > 1$ . Par le théorème sur les fonctions positives équivalentes,  $F(\alpha)$  existe pour tout  $\alpha > 1$ .

2. a) La formule géométrique donne ( $-t^\alpha \neq 1$ ) :

$$\frac{1}{1+t^\alpha} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{k\alpha} + (-1)^{n+1} \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha}$$

b) En intégrant sur  $[0, 1]$ , il vient :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^\alpha} dt = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^1 t^{k\alpha} dt + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt$$

Donc :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^\alpha} dt = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{1+k\alpha} + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt$$

Or :

$$\left| \int_0^1 \frac{t^{(n+1)\alpha}}{1+t^\alpha} dt \right| \leq \int_0^1 t^{(n+1)\alpha} dt = \frac{1}{1+(n+1)\alpha}$$

Cette dernière expression tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ . Ceci termine la question, soit :

$$G(\alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{1+k\alpha}$$

3. a) Le changement de variable proposé est de classe  $\mathcal{C}^1$ . En intégrant sur  $[1, A]$ , il vient :

$$\int_1^A \frac{dt}{1+t^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1} \int_{A^{1-\alpha}}^1 \frac{du}{1+u^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}$$

En prenant la limite lorsque  $A$  tend vers l'infini, on obtient :

$$H(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1} G\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

b) Après simplifications,  $H(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{1 + k \frac{\alpha}{\alpha - 1}} = \sum_{h=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{h-1}}{h\alpha - 1}$ .

Il vient donc :

$$\begin{aligned} F(\alpha) &= G(\alpha) + H(\alpha) = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \left( \frac{1}{k\alpha - 1} - \frac{1}{k\alpha + 1} \right) \\ &= 1 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2 \alpha^2 - 1} \end{aligned}$$

Or  $\frac{1}{\alpha} \in ]0, 1[$ . Donc :

$$\frac{2}{\alpha} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2 - \frac{1}{\alpha^2}} = \frac{\pi}{\sin(\pi/\alpha)} - \alpha \implies 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2 \alpha^2 - 1} = \frac{\pi/\alpha}{\sin(\pi/\alpha)} - 1$$

D'où :

$$F(\alpha) = \frac{\pi/\alpha}{\sin(\pi/\alpha)}$$

### Exercice 1.7.

1. Montrer qu'il existe un polynôme  $P$  de  $\mathbb{R}[X]$  tel que, pour tout réel  $x$  :

$$(x^2 - 1)P'(x) + xP(x) = x^3 - x$$

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $h : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction vérifiant la relation suivante : pour tout  $x$  élément de  $I$ ,

$$(E) : (x^2 - 1)h'(x) + xh(x) = x^3 - x$$

2. Montrer que  $f = h - P$  est solution d'une équation différentielle  $(D)$  de la forme :

$$\forall x \in I, f'(x) = f(x)g(x)$$

On précisera la fonction  $g$  et les intervalles  $I$  sur lesquels  $g$  est continue.

3. Résoudre l'équation  $(D)$  sur chacun de ces intervalles.

4. En déduire les fonctions  $h$  vérifiant  $(E)$  sur ces intervalles.

5. Existe-t-il des fonctions vérifiant  $(E)$  sur  $\mathbb{R}$  ?

6. Soit  $M_0$  un point du plan, de coordonnées  $(x_0, y_0)$ . Discuter selon les valeurs de  $x_0$  et  $y_0$  le nombre de courbes  $\mathcal{C}$  passant par  $M_0$  et d'équation  $y = h(x)$ , où  $h$  est une fonction vérifiant  $(E)$ .

### Solution :

1. En notant  $k$  le degré du polynôme  $P$  cherché, on a :

$$P(x) = ax^k + \dots, P'(x) = kax^{k-1} + \dots$$

D'où :

$$(x^2 - 1)P'(x) + xP(x) = (k + 1)ax^{k+1} + \dots$$

Donc  $k = 2$  et on peut écrire  $P(x) = ax^2 + bx + c$  et en remplaçant dans l'équation, il vient :

$$\begin{cases} 3a = 1 \\ 2b = 0 \\ c - 2a = -1 \\ -b = 0 \end{cases}, \text{ soit } \begin{cases} a = 1/3 \\ b = 0 \\ c = -1/3 \end{cases} \text{ et :}$$

$$P(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 1)$$

2. En soustrayant, la fonction  $f$  vérifie l'équation :

$$f'(x)(x^2 - 1) + xf(x) = 0$$

Ainsi  $g(x) = \frac{-x}{x^2 - 1}$ , sur les intervalles  $]-\infty, -1[$ ,  $]-1, 1[$  ou  $]1, +\infty[$ .

3. Sur chacun de ces intervalles,  $f$  est de la forme  $Ke^G$ , où  $K$  est une constante (dépendant de l'intervalle) et  $G$  une primitive de  $g$  sur cet intervalle ; soit :

$$f(x) = \frac{K}{\sqrt{|x^2 - 1|}}$$

4. Par les questions précédentes,

$$h_I(x) = \frac{K_I}{\sqrt{|x^2 - 1|}} + \frac{x^2 - 1}{3}$$

sur chaque intervalle  $I$ .

5. S'il existe une solution  $\varphi$  de  $(E)$  définie sur  $\mathbb{R}$ , sa restriction à chaque intervalle  $I$  doit être une fonction  $h_I$  trouvée dans la question précédente. De plus, la fonction  $\varphi$  doit être dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

Or les fonctions  $h_I$  se raccordent en  $\pm 1$  si et seulement si  $K_I = 0$ , pour chaque intervalle. Ainsi  $P$  est la seule solution sur  $\mathbb{R}$ .

6. ★ Si  $x_0 \neq \pm 1$ , quel que soit  $y_0$ , il existe une solution unique donnée par la constante  $K = \left(y_0 - \frac{x_0^2 - 1}{3}\right) \sqrt{|x_0^2 - 1|}$ .

★ Si  $(x_0, y_0) = (\pm 1, 0)$ , alors  $K = 0$  donne la solution.

★ Si  $x_0 = \pm 1$  et  $y_0 \neq 0$ , il n'existe pas de solution.

### Exercice 1.8.

1. Soit  $f$  une fonction continue de  $\mathbb{R}^+$  dans  $\mathbb{R}^+$  non identiquement nulle telle que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f(t) dt$  converge. Montrer que  $\int_0^{+\infty} f(t) dt > 0$ .

2. a) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4 + t^4}} dt$  converge.

On pose alors, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$  :  $I_n = \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4 + t^4}} dt$ .

b) Étudier la monotonie de la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

c) Montrer la convergence de la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  et déterminer sa limite.

3. a) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a :  $0 \leq I_n \leq \frac{6}{n^4}$ .

b) En déduire le développement limité de  $I_n$  à l'ordre 7.

4. Justifier la convergence de la série de terme général  $I_n$  et exprimer sa somme  $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$  sous la forme d'une intégrale.

---

**Solution :**

1. C'est une question de cours : comme  $f$  est positive, on sait que  $\int_0^{+\infty} f(t) dt \geq 0$ . Supposons cette intégrale nulle. Alors, pour tout  $A > 0$  :

$$0 \leq \int_0^A f(t) dt \leq \int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$$

Donc  $\int_0^A f(t) dt = 0$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[0, A]$  et positive : c'est la fonction nulle sur  $[0, A]$ . Ceci étant valable pour tout  $A$ ,  $f$  est identiquement nulle sur  $\mathbb{R}^+$ .

2. a) Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ ,  $h : t \mapsto \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4 + t^4}}$  est continue et positive sur  $\mathbb{R}^+$ .

Au voisinage de  $+\infty$ ,  $h(t) = o(e^{-t/2})$ . On conclut par le théorème de comparaison des fonctions positives :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4 + t^4}} dt \text{ converge}$$

b) De manière évidente :

$$0 < \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n^2}, \text{ et } \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{(n+1)^4 + t^4}} < \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4 + t^4}}$$

Ainsi  $0 < I_{n+1} < I_n$ . La suite  $(I_n)$  est strictement décroissante.

c) Par la question précédente, la suite  $(I_n)$  converge puisqu'elle est minorée par 0. En fait, pour  $n \geq 1$  :

$$0 < I_n \leq \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{t^4}} dt = \frac{C}{n^2}$$

ce qui montre que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

3. a) On a :

$$0 < I_n \leq \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} \frac{t^3 e^{-t}}{\sqrt{n^4}} dt = \frac{\Gamma(4)}{n^4} = \frac{6}{n^4}$$

b) On a :

$$\begin{aligned} \left| I_n - \frac{6}{n^4} \right| &\leq \frac{1}{n^4} \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} \left| \frac{n^2}{\sqrt{n^4 + t^4}} - 1 \right| dt \\ &\leq \frac{1}{n^4} \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} \left| \frac{t^4}{\sqrt{n^4 + t^4} (n^2 + \sqrt{n^4 + t^4})} \right| dt \leq \frac{\Gamma(8)}{n^8} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\left| I_n - \frac{6}{n^4} \right| = o\left(\frac{1}{n^7}\right)$$

4. La convergence est immédiate au vu de la question 3. a). Pour calculer la somme de la série, on effectue dans  $I_n$  le changement de variable linéaire  $t = nu$ . Il vient, pour tout  $N \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^N I_k = \int_0^{+\infty} \frac{u^3 e^{-u}}{(1 - e^{-u}) \sqrt{1 + u^4}} du - R_N$$

avec

$$R_N = \int_0^{+\infty} \frac{u^3 e^{-(N+1)u}}{(1 - e^{-u}) \sqrt{1 + u^4}} du$$

Soit  $\varphi : u \mapsto \frac{u^3 e^{-u}}{(1 - e^{-u}) \sqrt{1 + u^4}}$ . La fonction  $\varphi$  est définie et continue sur  $]0, +\infty[$  et telle que  $\lim_{u \rightarrow 0} \varphi(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \varphi(u) = 0$ . Ainsi, il existe  $M > 0$  tel que :

$$\sup_{u \in \mathbb{R}^+} |\varphi(u)| \leq M$$

et

$$0 \leq R_N \leq M \int_0^{+\infty} e^{-Nu} du = \frac{M}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

Donc :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} I_k = \int_0^{+\infty} \frac{u^3 e^{-u}}{(1 - e^{-u}) \sqrt{1 + u^4}} du$$

### Exercice 1.9.

Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , on définit  $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  par :



$$f_n(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$$

1. Déterminer les valeurs de  $n$  pour lesquelles l'intégrale  $\int_0^{+\infty} f_n(x)dx$  converge.

On pose alors  $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x)dx$ .

2. a) Montrer que  $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} \frac{f_n(x)}{f_2(x)}$  existe (avec  $n \geq 2$ ) et donner un majorant de cette quantité.

b) En déduire la nature de la série de terme général  $I_n$ .

3. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .

a) Donner un équivalent de  $H_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

b) Pour tout  $x \in [0, 1]$ , calculer  $\frac{f'_n(x)}{f_n(x)}$ . Donner un encadrement de cette quantité en fonction des termes de la suite  $(H_k)_{k \geq 1}$ .

c) En déduire que, lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ ,  $\int_0^1 f_n(x)dx$  est équivalent à  $\frac{1}{n! \ln n}$ .

4. Exprimer, pour tout  $n \geq 2$ ,  $I_{n+1}$  en fonction de  $\int_0^1 f_n(x)dx$ . Donner un équivalent de  $I_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .

---

### Solution :

1. La fonction  $f_n$  est continue sur  $[0, +\infty[$  et  $f_n(x) \underset{(+\infty)}{\sim} \frac{1}{x^n}$ , la règle de Riemann montre alors que  $I_n$  existe si et seulement si  $n \geq 2$ .

2. a) Pour  $n \geq 3$ ,  $0 \leq \frac{f_n(x)}{f_2(x)} = \frac{1}{(x+3)\cdots(x+n)} \leq \frac{2}{n!}$ , le résultat restant valable pour  $n = 2$  :

$$\forall n \geq 2, \forall x \geq 0, \frac{f_n(x)}{f_2(x)} \leq \frac{2}{n!}$$

b) On a donc, par conservation des inégalités par intégration, lorsque les bornes sont dans l'ordre croissant :

$$\forall n \geq 2, I_n \leq \frac{2I_2}{n!}$$

La série de terme général  $I_n$  est donc convergente.

3. a) Pour tout  $k$  de  $\mathbb{N}^*$  :  $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$ , d'où par sommation :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \int_1^n \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Soit :

$$\ln n \leq H_n \leq 1 + \ln n$$

b)  $\forall x \in [0, 1]$ ,  $\frac{f'_n(x)}{f_n(x)} = (\ln f_n)'(x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{x+k}$ , et ainsi :

$$H_{n+1} - 1 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \leq -\frac{f'_n(x)}{f_n(x)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n$$

c) On a donc :

$$-\frac{1}{H_n} f'_n(x) \leq f_n(x) \leq -\frac{1}{H_{n+1} - 1} f'_n(x)$$

et, en intégrant sur  $[0, 1]$  :

$$-\frac{1}{H_n} (f_n(1) - f_n(0)) \leq \int_0^1 f_n(x) dx \leq -\frac{1}{H_{n+1} - 1} (f_n(1) - f_n(0))$$

Comme  $f_n(0) - f_n(1) = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n}{(n+1)!}$  :

$$\frac{n}{(n+1)!H_n} \leq \int_0^1 f_n(x) dx \leq \frac{n}{(n+1)!(H_{n+1} - 1)}$$

Avec  $H_n \sim H_{n+1} - 1 \sim \ln n$ , il vient donc :

$$\int_0^1 f_n(x) dx \sim \frac{1}{n! \ln n}$$

4. Pour  $n \geq 2$  :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \int_1^{+\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)} - \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+2)(x+3)\dots(x+n+1)} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{n}{(x+1)(x+2)\dots(x+n+1)} dx \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\int_0^1 f_n(x) dx = nI_{n+1}$$

et :

$$I_n = \frac{1}{n-1} \int_0^1 f_{n-1}(x) dx \sim \frac{1}{n(n-1)! \ln(n-1)} \sim \frac{1}{n! \ln n}$$

### Exercice 1.10.

Dans tout l'exercice,  $f$  désigne une fonction convexe et de classe  $C^2$  sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

1. Dans cette question, on suppose que  $I = \mathbb{R}$ .

a) Montrer que pour tout  $a \in \mathbb{R}^+$ , on a  $f(a) - f(0) \leq af'(a)$ .

b) On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par :  $g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$ .  
Montrer que  $g$  est croissante.

c) En déduire que le rapport  $\frac{f(x)}{x}$  admet toujours une limite (finie ou égale à  $+\infty$ ) lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

d) On suppose dans cette question que  $f$  est majorée sur  $\mathbb{R}$ . Vérifier que la fonction  $x \mapsto f(-x)$  est aussi convexe et majorée sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $f(0)$  est un maximum global (on pourra appliquer ce qui précède à la fonction  $f$  et à la fonction  $x \mapsto f(-x)$ ). Prouver ensuite que c'est aussi un minimum global et en déduire que  $f$  est nécessairement constante.

2. Dans cette question on suppose que  $I = \mathbb{R}^+$  et que le rapport  $\frac{f(x)}{x}$  tend vers une limite finie  $\ell$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

a) Montrer que la fonction  $g$ , définie sur  $\mathbb{R}^+$  par  $g(x) = f(x) - \ell x$ , est convexe.

b) Soit  $a$  un réel positif et  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^+ \setminus \{a\}$  par :

$$h(x) = \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Montrer que  $h$  est croissante. Quelle est la limite de  $h$  en  $+\infty$  ?

c) Montrer que la fonction  $g$  est décroissante.

d) En déduire que  $g$  admet une limite en  $+\infty$  qui peut être finie ou égale à  $-\infty$ .

e) On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par  $f(x) = -\ln(1+x)$ . Déterminer, pour cette fonction  $f$ , la limite de  $g$  en  $+\infty$ .

3. On suppose que  $I = \mathbb{R}$ . En utilisant la fonction  $x \mapsto f(-x)$ , que peut-on déduire de la question précédente ?

4. Soit  $\varphi$  une fonction de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x} = 0$ . Montrer que  $\varphi''$  s'annule au moins une fois sur  $\mathbb{R}$ .

**Solution :**

1. a) Comme  $f$  est convexe et dérivable,  $f'$  est croissante et :

$$f(a) - f(0) = \int_0^a f'(t) dt \leq f'(a) \int_0^a dt = af'(a)$$

b) La fonction  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  et pour tout  $x > 0$  :

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x) + f(0)}{x^2} \geq 0$$

La fonction  $g$  est bien croissante.

c) La fonction  $g$  étant croissante, la seule alternative est :

$$\text{soit } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, \text{ soit } \exists \ell \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ell$$

Dans le premier cas, on a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  et dans le second  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$ .

d) Si  $f$  est majorée sur  $\mathbb{R}$  il en est de même de la fonction  $\varphi : x \mapsto f(-x)$  et comme  $\varphi''(x) = (-1)^2 f''(-x) \geq 0$ ,  $\varphi$  est également convexe.

La fonction  $g$  associée à  $f$  est donc croissante et de limite nulle en  $+\infty$ , donc  $\forall x \in \mathbb{R}^+, g(x) \leq 0$ , ainsi  $f$  est majorée sur  $\mathbb{R}^+$  par  $f(0)$ , donc admet un maximum global sur  $\mathbb{R}^+$  valant  $f(0)$  et en particulier  $f'_d(0) \leq 0$ . Le même raisonnement appliqué à la fonction  $\varphi$  prouve que  $f(0)$  est un maximum global de  $f$  sur  $\mathbb{R}^-$  et en particulier  $f'_g(0) \geq 0$ .

Ainsi  $f'(0) = 0$  et comme  $f'$  est croissante,  $f'$  est positive sur  $\mathbb{R}^+$ , négative sur  $\mathbb{R}^-$  et  $f$  admet un minimum global en 0. Finalement  $f$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .

2. a) Comme  $g'' = f''$ , la fonction  $g$  est convexe sur  $\mathbb{R}^+$ .

$$\text{b) Pour } x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{a\}, \text{ on a } h'(x) = \frac{(x-a)g'(x) - g(x) + g(a)}{(x-a)^2}.$$

Comme  $g$  est convexe, on a  $g(a) \geq g(x) + (a-x)g'(x)$  (la courbe est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse  $x$ ) et  $h'(x) \geq 0$ .

La fonction  $h$  est donc croissante sur  $[0, a[$  et sur  $]a, +\infty[$  et comme elle est prolongeable par continuité en  $a$  (la fonction  $g$  est dérivable en  $a$ ), la fonction  $h$  est croissante sur  $\mathbb{R}^+$ .

Par ailleurs  $h(x) = \frac{x}{x-a} \times \frac{f(x)}{x} - \ell - \frac{f(a)}{x-a}$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$ .

c) La fonction  $h$  est croissante sur  $\mathbb{R}^+$  et de limite nulle en  $+\infty$ , donc  $h$  est négative sur l'intervalle  $[a, +\infty[$  pour tout  $a \geq 0$ .

Ainsi  $x \geq a \implies g(x) \leq g(a)$  et l'universalité de cette implication montre que  $g$  est décroissante sur  $\mathbb{R}^+$ .

d) La fonction  $g$  est décroissante et cette fois l'alternative est : ou bien elle a une limite en  $+\infty$  ou bien elle diverge vers  $-\infty$  en  $+\infty$ .

e) On a  $f''(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$  et  $f$  est bien convexe sur  $\mathbb{R}^+$ . Clairement  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ .

3. En appliquant ce qui précède à la fonction  $x \mapsto f(-x)$ , on en déduit que  $\frac{f(x)}{x}$  a une limite finie ou infinie en  $-\infty$  et que si la limite est finie valant  $\ell$ , alors  $x \mapsto f(x) - \ell x$  a une limite en  $-\infty$ , finie ou valant  $-\infty$ .

4. Supposons que  $\varphi''$  ne s'annule pas, alors quitte à changer  $\varphi$  en  $-\varphi$ , on peut supposer que  $\varphi''$  est toujours positive et  $\varphi$  est alors convexe. Ce qui précède montre que  $\varphi$  admet une limite en  $-\infty$  et en  $+\infty$ , ces limites étant finies ou valant  $-\infty$ . Ainsi  $\varphi$  est majorée sur  $\mathbb{R}$  et est donc constante, ce qui est incompatible avec le fait que  $\varphi''$  ne s'annule jamais !

### Exercice 1.11.

Dans tout cet exercice  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  désigne une suite réelle décroissante de limite nulle.

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on pose :  $b_n = n(a_{n-1} - a_n)$ .

1. Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a :  $\sum_{k=1}^n b_k = \left( \sum_{k=0}^{n-1} a_k \right) - na_n$ .

2. On suppose dans cette question que la série de terme général  $a_n$  converge.

a) Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$ .

b) En déduire que la série de terme général  $b_n$  converge et que  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ .

3. On suppose dans cette question que la série de terme général  $b_n$  converge.

a) Montrer que pour tout  $n$  et  $k$  de  $\mathbb{N}^*$ , on a :  $n(a_n - a_{n+k}) \leq \sum_{j=n+1}^{n+k} b_j$ .

b) En déduire que la série de terme général  $a_n$  converge et que  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .

**Solution :**

1. Il suffit de faire le calcul :

$\sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (ka_{k-1} - ka_k) = \sum_{h=0}^{n-1} (h+1)a_h - \sum_{k=0}^n ka_k$ , et par télescopage partiel :

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k - na_n$$

2. a)  $\star$  Par décroissance et positivité de la suite  $(a_n)$ , on a :

$$0 \leq na_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} a_k$$

Avec  $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ , on a donc :  $0 \leq na_{2n} \leq A_{2n} - A_{n+1}$  et la convergence de la série de terme général  $a_n$  étant la convergence de la suite  $(A_n)$ , en notant  $L$  sa limite, on a  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_{2n} - A_{n+1} = L - L = 0$ , soit par encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2na_{2n} = 0$$

$\star$  Puis,  $0 \leq (2n+1)a_{2n+1} \leq 2na_{2n} + a_{2n}$  donne, puisque  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)a_{2n+1} = 0$$

Donc, par exhaustion :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$$

b) Le résultat de la question 1. donne alors directement la convergence de la série de terme général  $b_n$ , avec :

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

3. a)  $\sum_{j=n+1}^{n+k} b_j = \sum_{j=1}^{n+k} b_j - \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{k=0}^{n+k-1} a_k - (n+k)a_{n+k} - \sum_{k=0}^{n-1} a_k + na_n$   
 $= \sum_{k=n}^{n+k-1} a_k + na_n - (n+k)a_{n+k}$

et comme  $\sum_{k=n}^{n+k-1} a_k \geq ka_{n+k}$ , il vient bien :

$$\sum_{j=n+1}^{n+k} b_j \geq n(a_n - a_{n+k})$$

b) On en déduit :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n+k} b_j &= \sum_{j=1}^n b_j + \sum_{j=n+1}^{n+k} b_j \geq \sum_{m=0}^{n-1} a_m - na_n + n(a_n - a_{n+k}) \\ &\geq \sum_{m=0}^{n-1} a_m - na_{n+k} \end{aligned}$$

$$\sum_{m=0}^{n-1} a_m \leq \sum_{j=1}^{n+k} b_j + na_{n+k}$$

On fixe  $k$  et on fait tendre  $n$  vers l'infini, comme  $a_{n+k} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ , il vient par prolongement des inégalités à la limite :

$$\sum_{m=0}^{n-1} a_m \leq \sum_{j=1}^{\infty} b_j$$

Les sommes partielles étant majorées et le terme général positif, on en déduit que la série de terme général  $u_n$  est convergente et la question 2. assure alors l'égalité des sommes demandées.

### Exercice 1.12.

1. Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  fixé. Étudier, pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , l'existence de l'intégrale  $\int_0^1 \frac{x^{kn}}{1+x^k} dx$ .

Pour les valeurs de  $n$  pour lesquelles cette intégrale converge, on pose alors :

$$I_n = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{kn}}{1+x^k} dx$$

2. Montrer que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.

3. Déterminer un équivalent de  $I_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$  (on pourra effectuer une intégration par parties).

4. Exprimer  $I_0 - I_n$  sous forme d'une somme et en déduire la nature de la série de terme général  $u_n = \frac{(-1)^n}{kn+1}$ .

5. On considère la procédure Pascal suivante :

```
procedure Oral_escp(N,K : integer)
```

```

Var S : integer ;
Begin
  if (N=0) then writeln('1')
  else begin
    Oral_escp(N-1,K) ;
    if (N MOD 2=0) then S := 1 else S := -1 ;
    writeln(S/(K*N+1))
  end ;
End ;

```

Que produit l'appel suivant : Oral\_escp (3,2) ; ?

---

**Solution :**

1. ★ Si  $n \geq 0$ ,  $I_n$  existe car la fonction à intégrer est continue sur le segment  $[0, 1]$ .

★ Si  $n < 0$ , alors  $\frac{x^{kn}}{1+x^k} \underset{(0)}{\sim} x^{kn}$  et l'intégrale existe si et seulement si  $kn < -1$ , ce qui est toujours le cas, sauf pour  $n = -1$  et  $k = 1$ . Bref :

$I_n$  existe sauf dans le cas  $n = -1$  et  $k = 1$

2.  $|I_n| \leq \int_0^1 x^{kn} dx = \frac{1}{kn+1}$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

3. En intégrant par parties :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^{kn}}{1+x^k} dx &= \left[ \frac{x^{kn+1}}{kn+1} \times \frac{1}{1+x^k} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{kn+1}}{kn+1} \times \frac{-kx^{k-1}}{(1+x^k)^2} dx \\ &= \frac{1}{2(kn+1)} + \frac{k}{kn+1} \int_0^1 \frac{x^{k(n+1)}}{(1+x^k)^2} dx \end{aligned}$$

Comme  $\int_0^1 \frac{x^{k(n+1)}}{(1+x^k)^2} dx \leq \int_0^1 x^{k(n+1)} dx = \frac{1}{k(n+1)+1}$ , on en déduit :

$$\frac{1}{2(kn+1)} \leq (-1)^n I_n \leq \frac{1}{2(kn+1)} + \frac{k}{kn+1} \times \frac{1}{kn+k+1}$$

Ainsi :

$$I_n \underset{(\infty)}{\sim} \frac{(-1)^n}{2kn}$$

4.  $I_0 - I_n = \int_0^1 \frac{1 - (-x^k)^n}{1+x^k} dx = \sum_{\ell=0}^{n-1} \int_0^1 (-x)^{k\ell} dx = \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k\ell}}{k\ell+1}$

Ainsi :



$$(-1)^k (I_0 - I_n) = \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{(-1)^\ell}{k\ell + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (-1)^k I_0$$

Ce qui prouve la convergence demandée.

5. Il affiche, pour  $k = 2$ , les valeurs de  $u_0, u_1, u_2, u_3$ .

### Exercice 1.13.

1. a) Montrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , on a :

$$|x \ln(x^2 + y^2)| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \times |\ln(x^2 + y^2)|$$

b) En déduire que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , à valeurs réelles par :

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)^x$$

est prolongeable en une fonction continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

2. Étudier l'existence des dérivées partielles d'ordre 1 de  $f$  en tout point .

3. Déterminer les points critiques de  $f$ .

4. a) Montrer que  $f$  n'admet pas d'extremum local en  $(0, 0)$  (on pourra étudier  $h : x \mapsto f(x, 0) - 1$ ).

b) Montrer que  $f$  admet un minimum local en  $(e^{-1}, 0)$ .

c) Montrer que  $f$  n'admet pas d'extremum local en  $(0, 1)$ .

### Solution :

1. a) On a  $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ , donc  $|x \ln(x^2 + y^2)| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \ln(x^2 + y^2)$ , ou encore :

$$|x \ln(x^2 + y^2)| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \ln(\sqrt{x^2 + y^2})$$

b) Comme  $\lim_{u \rightarrow 0^+} 2u \ln u = 0$ , il vient :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \ln(x^2 + y^2) = 0$$

Or pour  $(x, y) \neq (0, 0)$ ,  $f(x, y) = \exp(x \ln(x^2 + y^2)) \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1$ , soit :

En posant  $f(0, 0) = 1$ ,  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

2.  $\star$   $f$  est clairement de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , avec en particulier :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \left( \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} \right) \exp(x \ln(x^2 + y^2))$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \exp(x \ln(x^2 + y^2))$$

$$\star \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0 \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0, \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \text{ existe et vaut } 0.$$

$$\star \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \frac{e^{x \ln x^2} - 1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty, \text{ donc } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \text{ n'existe pas.}$$

$$3. \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} xy = 0 \\ \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \text{ et } y \in \{-1, 1\} \\ \text{ou} \\ y = 0 \text{ et } x \in \{-1/e, 1/e\} \end{cases}$$

Il existe donc quatre points critiques.

$$4. \text{ a) Soit } h \text{ définie par : } h(x) = f(x, 0) - 1 = \begin{cases} e^{x \ln x^2} - 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Si } x \in ]0, 1[, f(x, 0) - 1 < 0 \text{ et si } x \in ]-1, 0[, f(x, 0) - 1 > 0$$

Donc  $f$  n'a pas d'extremum local en  $(0, 0)$ .

$$\text{b) Pour } y \neq 0, \ln(x^2 + y^2) > \ln x^2, \text{ donc si } x > 0, x \ln(x^2 + y^2) \geq x \ln x^2 \text{ et}$$

$$f(x, y) \geq f(x, 0) = h(x) + 1.$$

Une étude rapide de la fonction  $h$  montre que la restriction de  $h$  à  $\mathbb{R}^+$  est minimale au point  $1/e$  (car on a  $h'(x) = e^{x \ln x^2} (2 + \ln x^2)$ ), on peut donc écrire :

$$\forall x > 0, \forall y \neq 0, f(x, y) \geq h(e^{-1}) + 1 = f(e^{-1}, 0)$$

$f$  admet donc un minimum local en  $(e^{-1}, 0)$ .

c)  $f(x, 1) - f(0, 1) = e^{x \ln(x^2+1)} - 1$  qui est du signe de  $x$ , donc  $f$  n'admet pas d'extremum en  $(0, 1)$ .

### Exercice 1.14.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $f_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} e^{-x}$ .

1. Étudier les variations de la fonction  $f_n$  et tracer sa courbe représentative dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

2. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'intégrale,  $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$  converge et donner sa valeur en fonction de  $n$ .

3. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $x \geq 0$ , on a :  $f_n(x) = \int_x^{+\infty} \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt$ .

4. Montrer que pour tout  $x \geq 0$ ,  $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} e^{-x} f_{n-k}(x) = f_n(2x)$ .

5. Vérifier que, pour tout  $x > 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'intégrale  $\int_x^{+\infty} f_n(t) dt$  est convergente et a pour valeur  $\sum_{k=0}^n f_k(x)$ .

6. Comparer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt \right]$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt \right]$$

**Solution :**

1. On a :  $f'_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-x} - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} x^k = -\frac{x^n}{n!} e^{-x}$

Donc :

$n$  pair :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'_n(x)$		$- \ 0 \ -$	
$f_n$	$+\infty$	$\searrow \ 1 \ \searrow$	$0$

$n$  impair :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'_n(x)$		$+ \ 0 \ -$	
$f_n$	$-\infty$	$\nearrow \ 1 \ \searrow$	$0$

2. La question précédente donne :

$$\int_a^b t^n e^{-t} dt = n!(f_n(a) - f_n(b))$$

Donc :

$$I_n = n!$$

3. De même :

$$\int_x^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n! f_n(x)$$

4.  $f_n(2x) = \int_{2x}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt$ . Et, avec le changement de variable  $t = u + x$  :

$$\begin{aligned}
 f_n(2x) &= \int_x^{+\infty} \frac{(u+x)^n}{n!} e^{-(u+x)} du = \int_x^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} x^k u^{n-k} e^{-x} e^{-u} du \\
 &= e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \int_x^{+\infty} \frac{u^{n-k}}{(n-k)!} e^{-u} du \\
 f_n(2x) &= e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f_{n-k}(x)
 \end{aligned}$$

5. La convergence est immédiate, par croissances comparées, et :

$$\int_x^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{k=0}^n \int_x^{+\infty} \frac{t^k}{k!} e^{-t} dt = \sum_{k=0}^n f_k(x)$$

6. On a, respectivement :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 1) = 0$$

et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

### Exercice 1.15.

Pour tout entier naturel  $n$ , on définit le polynôme  $P_n$  par :

$$P_0 = 1, P_1 = X, \dots, P_n = \frac{X(X-1) \cdots (X-n+1)}{n!}, \dots$$

Soit  $f$  une application définie sur  $\mathbb{R}^+$  à valeurs réelles, de classe  $C^\infty$ .

1. Montrer que pour tout entier relatif  $j$ ,  $P_n(j)$  est un entier relatif.
2. Montrer qu'il existe une unique suite de réels  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  possédant la propriété suivante :

« pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $f(x) - \sum_{k=0}^n a_k P_k(x)$  s'annule aux points  $0, 1, 2, \dots, n$ . »

(on pourra résoudre un système d'équations linéaires d'inconnues  $a_0, a_1, \dots, a_n$ .) ■

3. Soit  $b > 0$  donné.

Montrer que la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  associée à la fonction  $f : x \mapsto f(x) = b^x$  est définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par :  $a_n = (b-1)^n$ .

4. Soit  $x \geq 0$  fixé. Montrer que pour tout entier naturel  $N$ , il existe un réel  $\theta$  tel que :

$$f(x) = \sum_{k=0}^N a_k P_k(x) + P_{N+1}(x) f^{(N+1)}(\theta)$$

(on pourra utiliser la fonction  $g : t \mapsto g(t) = f(t) - \sum_{k=0}^N a_k P_k(t) - AP_{N+1}(t)$ , où  $A$  est une constante judicieusement choisie, et appliquer le théorème de Rolle).

---

**Solution :**

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

★ Si  $0 \leq j \leq n - 1$ , alors  $P_n(j) = 0$  ;

★ Si  $j \geq n$ , alors  $P_n(j) = \binom{n}{j}$  ;

★ Si  $j < 0$ ,  $P_n(j) = (-1)^n \frac{|j|(|j|+1)\dots(|j|+n-1)}{n!} = (-1)^n \binom{|j|+n-1}{|j|}$ .

dans tous les cas  $P_n(j) \in \mathbb{Z}$ .

2. Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on veut réaliser  $\sum_{k=0}^n a_k P_k(j) = f(j)$  pour tout  $j$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ .

Matriciellement cela se traduit par :

$$M \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(0) \\ \vdots \\ f(n) \end{pmatrix}$$

où  $M$  est la matrice de terme générique  $m_{i,j} = \binom{i}{j}$ , les lignes et les colonnes étant pour une fois numérotées de 0 à  $n$ .

Cette matrice est trigonale inférieure, les coefficients diagonaux valant tous 1, ce qui prouve que  $M$  est inversible.

On peut calculer l'inverse de  $M$  en interprétant l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$  canoniquement associé à  ${}^t M$  : cet endomorphisme est l'application  $P(X) \mapsto P(X+1)$ , dont l'isomorphisme réciproque est l'application  $P(X) \mapsto P(X-1)$  de matrice  ${}^t M^{-1}$ .

Bref, on trouve  $M^{-1}$  de terme générique  $m'_{i,j} = (-1)^{i+j} \binom{i}{j}$  et ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_j = \sum_{k=0}^j (-1)^{j+k} \binom{j}{k} f(k)$$

On constate que ces nombres sont bien indépendants de  $n$  et uniquement déterminés par  $f$ .

3. Ici :  $a_j = \sum_{k=0}^j (-1)^{j+k} \binom{j}{k} b^k = (-1)^j \sum_{k=0}^j (-b)^k \binom{j}{k} = (-1)^j (1-b)^j$ , soit :

$$\forall j \in \mathbb{N}, a_j = (b-1)^j$$

4. ★ Supposons dans un premier temps que  $x \notin \llbracket 0, N \rrbracket$ .

On définit la fonction  $g$  comme dans l'énoncé en choisissant  $A$  de façon à ce que l'on ait  $g(x) = 0$  (c'est possible, puisque  $P_{N+1}(x) \neq 0$ ).

La fonction  $g$  est indéfiniment dérivable et s'annule en  $(N+2)$  points distincts (les points  $0, 1, \dots, N$  et  $x$ ). En rangeant ces points et en appliquant de nombreuses fois le théorème de Rolle, on en déduit que la fonction  $g^{(N+1)}$  s'annule au moins une fois en un point que nous noterons  $\theta$  et qui est compris entre le plus petit et le plus grand des points utilisés, donc appartient à  $\mathbb{R}^+$ .

Or  $P_{N+1}$  est de degré  $N+1$  et de coefficient dominant  $\frac{1}{(N+1)!}$ , donc  $P_{N+1}^{(N+1)} = 1$  et il reste :

$$g^{(N+1)}(t) = f^{(N+1)}(x) - A$$

Donc  $A = f^{(N+1)}(\theta)$ , ce qu'il fallait.

★ Si  $x \in \llbracket 0, N \rrbracket$ , la formule demandée est vraie quel que soit le choix de  $\theta$ .

### Exercice 1.16.

Soit  $n$  un entier naturel. On considère la fonction  $F_n$  définie sur  $\mathbb{R}$  par, pour tout  $x$  réel :

$$F_n(x) = \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^n = \frac{1}{2^n n!} (x-1)^n (x+1)^n$$

et  $P_n$  l'application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par, pour tout  $x$  réel :

$$P_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ F_n^{(n)}(x) & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

où  $F_n^{(n)}$  désigne la dérivée d'ordre  $n$  de  $F_n$ .

1. Montrer que  $P_n$  est une fonction polynôme dont on déterminera le degré et le coefficient du terme de plus haut degré.

2. Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . On note  $B_{n,k}$  le polynôme défini par  $B_{n,k} = (X+1)^k (X-1)^{n-k}$ .

a) Montrer que  $(B_{n,0}, B_{n,1}, \dots, B_{n,n})$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

b) Montrer l'égalité :

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}^2 B_{n,k}$$

c) En déduire que  $P_n(1) = 1$  et  $P_n(-1) = (-1)^n$ .

d) Démontrer que  $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$ . Étudier la parité de  $P_n$  suivant les valeurs de  $n$ .

3. On suppose dans cette question que  $n \in \mathbb{N}^*$ . Soit  $p$  un entier tel que  $0 \leq p \leq n - 1$ .

a) Démontrer que, pour tout  $x$  réel :

$$F_n^{(p)}(x) = \sum_{k=0}^p \frac{p!}{2^n n!} \binom{n}{k} \binom{n}{p-k} B_{2n-p, n-k}(x)$$

b) En déduire que  $F_n^{(p)}(1) = 0$  et  $F_n^{(p)}(-1) = 0$ .

c) Démontrer que  $P_n$  possède  $n$  racines réelles distinctes dans l'intervalle  $] -1, 1[$ .

---

### Solution :

1.  $F_n$  est une fonction polynôme de degré  $2n$  et de coefficient dominant  $\frac{1}{2^n n!} X^{2n}$ , il en résulte que  $P_n = F_n^{(n)}$  est une fonction polynôme de degré  $n$  et de coefficient dominant :

$$\frac{2n(2n-1) \dots (n+1)}{2^n n!} X^n = \frac{1}{2^n} \binom{2n}{n} X^n$$

2. a) Soit  $\sum_{k=0}^n \alpha_k B_{n,k}(X) = 0$  une relation de dépendance entre les polynômes de la famille. Supposons les coefficients non tous nuls et soit  $i$  le plus petit des indices  $k$  tels que  $\alpha_k \neq 0$ . Il reste donc :

$$\alpha_i B_{n,i}(X) + \sum_{k=i+1}^n \alpha_k B_{n,k}(X) = 0.$$

Dans  $\mathbb{R}[X]$  on peut alors simplifier par  $(X+1)^i$  et en substituant ensuite à  $X$  la valeur  $-1$ , on trouve  $\alpha_i = 0$ , ce qui prouve que notre hypothèse est absurde.

(En clair la famille est libre car échelonnée en valuation par rapport à  $(X+1)$ ).

La famille est libre, formée d'éléments de  $\mathbb{R}_n[X]$ , et de cardinal *ad hoc*, il s'agit bien d'une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

b) Tout polynôme de  $\mathbb{R}_n[X]$  se décompose sur cette base, et en appliquant la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} P_n(X) &= \frac{1}{2^n n!} [(X-1)^n (X+1)^n]^{(n)} \\ &= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [(X-1)^n]^{(k)} [(X+1)^n]^{(n-k)} \\ &= \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times \frac{n!}{(n-k)!} (X-1)^{n-k} \times \frac{n!}{k!} (X+1)^k \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 B_{n,k}(X)$$

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}^2 B_{n,k}$$

c) A chaque fois, il n'y a qu'un terme utile et :

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n} B_{n,n}(1) = 1 ; P_n(-1) = \frac{1}{2^n} B_{n,0}(-1) = (-1)^n$$

d) On a :

$$\begin{aligned} P_n(-X) &= \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (-X+1)^k (-X-1)^{n-k} \\ &= (-1)^n \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (X-1)^k (X+1)^{n-k} = (-1)^n P_n(X) \end{aligned}$$

Ainsi  $P_n$  a même parité que  $n$ , si vous nous permettez cet abus.

3. a) Toujours grâce à la formule de Leibniz :

$$F_n^{(p)}(X) = \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \times \frac{n!}{(n-k)!} (X-1)^{n-k} \times \frac{n!}{(n-p+k)!} (X+1)^{n-p-k}$$

et en regroupant :

$$F_n^{(p)}(X) = \sum_{k=0}^p \frac{p!}{2^n n!} \binom{n}{k} \binom{n}{p-k} B_{2n-p, n-k}(X)$$

b) C'est clair par la formule précédente et on pourrait aussi invoquer le rapport entre l'ordre de multiplicité d'une racine et l'annulation des dérivées successives ...

c)  $\star F_n$  s'annule en  $-1$  et  $1$ , donc (Rolle)  $F_n'$  s'annule en au moins un point de  $] -1, 1[$ .

$\star F_n'$  s'annule en  $-1$  et  $1$  et en au moins un point de  $] -1, 1[$ , donc (Rolle et Rolle)  $F_n''$  s'annule en au moins deux points de  $] -1, 1[$ .

$\star$  Au bout de  $n$  opérations,  $F_n^{(n)}$  s'annule en au moins  $n$  points de l'intervalle  $] -1, 1[$  et comme  $F_n$  est de degré  $n$ ,  $F_n$  s'annule exactement  $n$  fois sur  $] -1, 1[$ .

### Exercice 1.17.

1. Soit  $f$  une fonction croissante de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+^*$ . Pour tout réel  $t > 0$ , on considère la fonction  $g_t$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par :  $g_t(x) = \frac{f(tx)}{f(x)}$ .

On suppose que, pour tout  $t > 0$ ,  $g_t(x)$  admet une limite finie quand  $x$  tend vers  $+\infty$ . On définit alors la fonction  $L$  par :  $\forall t > 0, L(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g_t(x)$ .



- a) Montrer que  $L$  est croissante et calculer  $L(1)$   
 b) Montrer que  $\forall (s, t) \in ]0, +\infty[^2$ ,  $L(st) = L(s) \times L(t)$ .  
 En déduire que :  $\forall x \in ]0, +\infty[$ ,  $L(\frac{1}{x}) = \frac{1}{L(x)}$ , puis que :

$$\forall s \in ]0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*, L(s^n) = (L(s))^n \text{ et } L(s^{1/n}) = (L(s))^{1/n}.$$

2. Montrer que  $L$  est continue sur  $]0, +\infty[$  (on pourra distinguer  $t = 1$  et  $t \neq 1$ ).

3. Pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ , on pose  $h(x) = \ln(L(e^x))$ .

a) Montrer que  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$ ,  $h(x+y) = h(x) + h(y)$ .

b) En considérant  $\int_0^1 h(x+t)dt$ , montrer que  $h$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  et calculer  $h'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .

c) En déduire qu'il existe  $k \in \mathbb{R}_+$  tel que :  $\forall t \in ]0, +\infty[$ ,  $L(t) = t^k$ .

---

### Solution :

1. a)  $0 < t_1 < t_2 \implies \forall x \geq 0, 0 \leq t_1 x \leq t_2 x \implies g_{t_1}(x) \leq g_{t_2}(x)$  et, par prolongement des inégalités à la limite :  $L(t_1) \leq L(t_2)$  :

La fonction  $L$  est croissante.

Il est clair que  $L(1) = 1$ .

b)  $\star$  On peut écrire :  $g_{st}(x) = \frac{f(stx)}{f(x)} = \frac{f(s(tx))}{f(tx)} \times \frac{f(tx)}{f(x)}$  et par passage à la limite lorsque  $x$  (donc aussi  $tx$ ) tend vers  $+\infty$  :

$$L(st) = L(s)L(t)$$

$\star$  Ainsi  $1 = L(1) = L(x\frac{1}{x}) = L(x)L(\frac{1}{x})$  et :

$$L(\frac{1}{x}) = \frac{1}{L(x)}$$

$\star L(st) = L(s)L(t)$  donne par un argument de récurrence simple :

$$\forall s > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, L(s^n) = (L(s))^n$$

$\star$  Ainsi :  $L(s) = L((s^{1/n})^n) = (L(s^{1/n}))^n$  et  $L(s^{1/n}) = (L(s))^{1/n}$

2. La fonction  $L$  est croissante, donc admet en tout point  $t$  une limite à gauche  $L_-(t)$  et une limite à droite  $L_+(t)$  et  $L$  est continue en  $t$  si la limite à gauche et la limite à droite en  $t$  sont égales ( d'ailleurs alors égales à  $L(t)$ ).

★ On a, par exemple :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{1/n} = 1$  et :

$$L_+(1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} L(2^{1/n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (L(2))^{1/n} = L(2)^0 = 1 = L(1)$$

★ On procède exactement de la même façon pour la limite à gauche en 1 en partant par exemple de  $(1/2)^{1/n} \dots$

$L$  est continue au point 1.

★ Soit  $x_0 \neq 1$  et  $(u_n)$  une suite quelconque convergente de limite  $x_0$ , alors par continuité de  $L$  en 1 :

$$L(u_n) = L\left(\frac{u_n}{x_0} x_0\right) = L\left(\frac{u_n}{x_0}\right) L(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(1) L(x_0) = L(x_0)$$

Et, par le théorème de continuité séquentielle,  $L$  est continue au point  $x_0$ .

$$\begin{aligned} 3. \text{ a) } h(x+y) &= \ln(L(e^{x+y})) = \ln(L(e^x e^y)) = \ln(L(e^x) L(e^y)) \\ &= \ln(L(e^x)) + \ln(L(e^y)) = h(x) + h(y). \end{aligned}$$

b) Soit  $H$  une primitive de la fonction continue  $h$ , on a :

$$\begin{aligned} H(x+1) - H(x) &= \int_x^{x+1} h(u) du = \int_0^1 h(x+t) dt = \int_0^1 (h(x) + h(t)) dt \\ &= h(x) + C \end{aligned}$$

La fonction  $H$  étant de classe  $\mathcal{C}^1$ , il vient en dérivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, h'(x) = h(x+1) - h(x) = h(x) + h(1) - h(x) = h(1)$$

Ainsi la fonction  $h$  est affine et comme  $h(0) = \ln(L(1)) = 0$ ,  $h$  est linéaire :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \geq 0, h(x) = \alpha x$$

Alors :

$$\forall t > 0, L(t) = L(e^{\ln t}) = e^{h(\ln t)} = e^{\alpha \ln t} = t^\alpha$$

### Exercice 1.18.

Dans tout cet exercice,  $I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ .

On définit une suite  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  d'applications de  $I$  sur  $\mathbb{R}$ , par :  $f_0 = 1$ , et pour tout  $n \geq 0$ , pour tout  $x \in I$  :

$$f_{n+1}(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (f_n(t) + f_n(t^2)) dt$$

1. a) Calculer  $f_1$  et  $f_2$ .

b) Montrer que pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $f_n$  est polynomiale.

2. a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sup_{x \in I} |f_n(x) - f_{n-1}(x)|$  existe. On le note

$D_n$ .

b) Calculer  $D_1$ .

c) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D_{n+1} \leq \frac{D_n}{2}$ . En déduire la limite de la suite  $(D_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

3. Montrer que pour tout  $x$  fixé de  $I$ , la suite réelle  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente. On note  $f(x)$  sa limite.

4. On note, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ .

a) Justifier l'existence de  $M_n$ .

b) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $M_n \leq 1 + \frac{M_{n-1}}{2}$ .

5. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , pour tout  $(x, y) \in I^2$  :  $|f_n(x) - f_n(y)| \leq 2|x - y|$ . En déduire que la fonction  $f$  est continue sur  $I$ .

6. a) Montrer que pour tout  $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ , pour tout  $x \in I$  :

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n} \left(1 - \frac{1}{2^p}\right)$$

b) En déduire que pour tout  $x \in I$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}$ .

c) Montrer que  $f$  vérifie, pour tout  $x$  de  $I$  :

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (f(t) + f(t^2)) dt$$

**Solution :**

1. a)  $f_1(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x 2 dt = 1 + x$  ;

$$f_2(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (2 + t + t^2) dt = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

b) Si  $t \mapsto f_n(t)$  est polynomiale, il en est de même de  $t \mapsto f_n(t^2)$  ; les fonctions polynomiales ayant des primitives polynomiales,  $t \mapsto f_{n+1}(t)$  est encore polynomiale. On conclut par l'argument de récurrence habituel.

2. a)  $f_n$  et  $f_{n-1}$  sont continues sur le segment  $[-1/2; 1/2]$ , donc y sont bornées, ainsi  $D_n$  existe.

b)  $f_1(x) - f_0(x) = x$ , donc  $D_1 = \frac{1}{2}$ .

c)  $|f_{n+1}(x) - f_n(x)| = \frac{1}{2} \left| \int_0^x ((f_n(t) - f_{n-1}(t)) + (f_n(t^2) - f_{n-1}(t^2))) dt \right|$

$$\leq \frac{1}{2} \left| \int_0^x (|f_n(t) - f_{n-1}(t)| + |f_n(t^2) - f_{n-1}(t^2)|) dt \right|$$

Comme  $t \in [-1/2, 1/2] \implies t^2 \in [-1/2, 1/2]$ , on peut majorer, et :

$$|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^x (D_n + D_n) dt \right| \leq D_n |x| \leq \frac{1}{2} D_n$$

et par passage à la borne supérieure :

$$D_{n+1} \leq \frac{1}{2} D_n$$

Ainsi  $D_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} D_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^n$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 0$ .

3. La question précédente montre que la série de terme général  $f_n(x) - f_{n-1}(x)$  est convergente pour tout  $x$  de  $I$ . Ceci signifie que la suite de terme général  $f_n(x)$  est convergente pour tout  $x$  de  $I$ .

4. a)  $f_n$  est continue sur  $I$ , donc bornée sur ce segment.

$$\begin{aligned} \text{b) } |f_n(x)| &= \left| 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (f_{n-1}(t) + f_{n-1}(t^2)) dt \right| \leq 1 + \frac{1}{2} \left| \int_0^x 2M_{n-1} dt \right| \\ &\leq 1 + M_{n-1} |x| \leq 1 + M_{n-1} \end{aligned}$$

D'où, par passage à la borne supérieure :

$$M_n \leq 1 + \frac{1}{2} M_{n-1}$$

$$5. |f_n(x) - f_n(y)| = \frac{1}{2} \left| \int_x^y (f_{n-1}(t) + f_{n-1}(t^2)) dt \right| \leq \frac{1}{2} |y - x| 2M_{n-1}.$$

Or une récurrence élémentaire montre que pour tout  $k$ ,  $M_k \leq 2$  et ainsi :

$$\forall x \in I, |f_n(x) - f_n(y)| \leq 2|x - y|$$

Par prolongement des inégalités à la limite, on a donc :

$$\forall x \in I, |f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|$$

et  $f$  est continue sur  $I$ .

$$6. \text{ a) } f_{n+p}(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p} (f_k(x) - f_{k-1}(x)), \text{ d'où :}$$

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x) - f_{k-1}(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^n (1 - \left(\frac{1}{2}\right)^p)$$

b)  $n$  étant fixé, ainsi que  $x$ , il n'y a plus qu'à faire tendre  $p$  vers l'infini, et :

$$\forall x \in I, |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}$$

c) Il suffit de vérifier que pour tout  $x$  de  $I$  :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x (f_n(t) + f_n(t^2)) dt = \int_0^x (f(t) + f(t^2)) dt$$

Or :

$$\left| \int_0^x ((f_n(t) - f(t)) - (f_n(t^2) - f(t^2))) dt \right| \leq \left| \int_0^x \left( \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right) dt \right| \leq \frac{1}{2^n}$$

On a donc bien le résultat annoncé, et donc :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 + \frac{1}{2} \int_0^x (f(t) + f(t^2)) dt$$

### Exercice 1.19.

Soit  $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ , l'espace vectoriel des fonctions définies et continues sur  $[0, 1]$ , à valeurs réelles.

À tout  $f \in E$ , on associe  $g$  définie sur  $[0, 1]$  par

$$g(x) = \int_0^1 \inf(x, t) f(t) dt$$

1. Vérifier que  $g$  est un élément de  $E$  et que l'application  $u : f \mapsto g$  est un endomorphisme de  $E$ .
2. Montrer que  $g = u(f)$  si et seulement si  $g$  est deux fois dérivable sur  $[0, 1]$  telle que  $g'' = -f$ ,  $g'(1) = 0$  et  $g(0) = 0$ .
3. L'application  $u$  est-elle injective ?

### Solution :

1. Pour  $x \in [0, 1]$ , on a :

$$g(x) = \int_0^1 \inf(x, t) f(t) dt = \int_0^x t f(t) dt + \int_x^1 x f(t) dt.$$

En notant  $F_1$  une primitive de  $t \mapsto t f(t)$  et  $F$  une primitive de  $f$ , on a donc :

$$g(x) = F_1(x) - F_1(0) + x(F(1) - F(x))$$

Sous cette forme, il est clair que la fonction  $g$  est continue sur  $[0, 1]$  (et même de classe  $\mathcal{C}^1$ ).

D'autre part, la linéarité de l'opérateur  $f \mapsto g$  résulte des propriétés des opérations et de la linéarité de l'opérateur « intégration sur  $[0, 1]$  ».

2. Soit  $f \in E$  et  $g = u(f)$ . Nous avons déjà dit que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$  et :

$$g'(x) = F_1'(x) + (F(1) - F(x)) - xF'(x) = xf(x) + F(1) - F(x) - xf(x)$$

$$\forall x \in [0, 1], g'(x) = \int_x^1 f(t) dt$$

La fonction  $g'$  est donc encore de classe  $\mathcal{C}^1$  et  $g''(x) = -f(x)$ .

Enfin,  $g(0) = F_1(0) - F_1(0) + 0 \times (F - 1) - F(0) = 0$  et  $g'(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$ .

Réciproquement, considérons une fonction  $g$  deux fois dérivable sur  $[0, 1]$ , telle que  $g(0) = 0$ ,  $g'(1) = 0$  et posons  $f = -g''$ . On a :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \inf(x, t) f(t) dt &= \int_0^x -tg''(t) dt - x \int_x^1 g''(t) dt \\ &= [-tg'(t)]_0^x + \int_0^x g'(t) dt - x[g'(t)]_x^1 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \inf(x, t) f(t) dt = -xg'(x) + g(x) - g(0) + xg'(x) - xg'(1) = g(x)$$

On a donc bien  $g = u(f)$ .

3. Si  $f$  est telle que  $g = u(f) = 0$ , alors  $g''$  est la fonction nulle sur  $[0, 1]$  et donc  $f$  aussi, ce qui prouve que  $u$  est un opérateur injectif.

