

QUESTIONS COURTES

1. Montrer que la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{1 + e^{-x}}$ vérifie les propriétés d'une fonction de répartition.
 2. Déterminer la loi de la borne supérieure M_n de n variables aléatoires indépendantes de même loi de fonction de répartition F .
 3. Étudier la convergence en loi de la suite $(M_n - \ln n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
-

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans \mathbb{N} .

1. Montrer que pour tout réel u tel que $|u| \leq 1$, $E(u^X)$ existe.
2. Montrer que pour tout $|u| < 1$:

$$\frac{1 - E(u^X)}{1 - u} = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k) u^k$$

Soit N une variable aléatoire à valeurs dans \mathbb{N} ; pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $p_n = P(N = n)$.

Soit X une variable aléatoire définie sur le même univers Ω et telle que, pour tout $n \in N(\Omega)$, la loi conditionnelle de X sachant $[N = n]$ est la loi uniforme sur $\{0, 1, \dots, n\}$.

1. Comparer la loi de X et celle de $N - X$.
 2. Si N suit une loi géométrique de paramètre p , calculer $E(X)$.
-

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans \mathbb{Z}^* , telle que

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad P(X = -n) = P(X = n) = \frac{1}{2n(n+1)}$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'événement $[(X = -n) \cup (X = n)]$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire X admet une espérance conditionnelle relative à A_n .

Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 0} E_{A_n}(X) P(A_n)$.

La variable aléatoire X admet-elle une espérance ?

Soient trois nombres complexes a, b, c . Calculer la matrice A^7 , avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 + i\sqrt{3} & a & b \\ 0 & 1 - i\sqrt{3} & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ définie par $a_{i,j} = 1$ si $i \neq j$ et $a_{i,i} > 1$ pour tout i .

Montrer que A est définie positive, c'est-à-dire que A est symétrique réelle telle que pour tout $X \in \mathbb{R}^n$ non nul, ${}^t X A X > 0$.

Soit f un endomorphisme de \mathbb{R}^3 tel que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ ne sont pas supplémentaires.

A-t-on : $[\text{Ker } f \subset \text{Im } f \text{ ou } \text{Im } f \subset \text{Ker } f]$?

Soient a et b deux nombres réels et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax + b + |x|$.

1. A quelle condition sur a et b la fonction f est-elle bijective ?
2. On suppose cette condition remplie. Calculer $f^{-1}(y)$ en fonction de y .

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant :

$$\forall x \in [0, +\infty[, 0 \leq f(x) \leq \int_0^x f(t) dt$$

Soit $h : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h(x) = e^{-x} \int_0^x f(t) dt$.

1. Montrer que la fonction h est décroissante.
2. En déduire que la fonction f est identiquement nulle.

Soit un réel a et f une fonction de classe $C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, telle que

$$\sup\{|f''(t)|, t \in \mathbb{R}\} = M \in \mathbb{R}.$$

On considère la fonction G définie par :

$$G(x) = \int_a^{a+x} f(u) du - xf(a + \frac{x}{2})$$

1. Interpréter géométriquement le nombre $G(x)$, pour f positive et $x > 0$.
2. Montrer que G est dérivable sur \mathbb{R} et que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, |G'(x)| \leq M \frac{x^2}{4}$$

3. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}, |G(x)| \leq M \frac{|x|^3}{12}$